

雌性外生殖器：前表皮突与后表皮突等长甚至长于后表皮突。囊导管细长，偶有短粗。囊体椭圆形，内面着生密刺。

分布：东洋界，澳洲界，非洲界。

备考：本属全世界记载约 86 种，中国记载下述 6 种。其中角三叶尺蛾 *S. angulosa* (Warren) 和浆三叶尺蛾 *S. remodesaria* Walker 为 Prout (1930) 记录分布中国海南。笔者尚未见到这二种的标本，在下述检索表中暂未包括。

种检索表

1. ♂ 后翅端部分裂为 3 瓣并互相折叠，中间一片黑色 2
 ♂ 后翅端部不分裂为 3 瓣，无黑色 狭带三叶尺蛾 *S. angustifasciata*
2. ♂ 前翅特别狭长；中足胫节基部具毛束；后足胫节毛束极浓密，形成黑色毛块；♀ 囊导管短粗 间三叶尺蛾 *S. interruptaria*
 ♂ 前翅中等宽度，中足无毛束；后足胫节端部毛束小，浅色；♀ 囊导管极细长 3
3. ♂ 前翅外缘在臀角上方具裂口；♂ ♀ 前翅颜色较均匀，无明显深色中带 蛭三叶尺蛾 *S. hirudinata*
 ♂ 前翅外缘在臀角上方无裂口；♂ ♀ 前翅中部具鲜明暗色中带 荫三叶尺蛾 *S. inscissa*

间三叶尺蛾 *Sauris interruptaria* (Moore, 1888) (图版 IV: 29)

Remodes interruptaria Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 270. (印度东部)

Remodes triseriata Moore, 1887, Lepid. Ceylon 3: 485, pl. 207: 1, 4.

Remodes cinerosa Warren, 1894, Novit. zool. 1: 397.

Sauris interruptaria: Inoue, 1977, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 13: 254.

前翅长：♂ 19 mm，♀ 14—19 mm。下唇须极长，约 3/4 以上伸出额外，橄榄绿色，基部有白色和少量灰褐色。头顶和胸腹部背面灰黄至灰黄绿色，肩片基部两侧和后胸后缘黑褐色，肩片端部灰褐色。足细长；♂ 中足具淡灰褐色毛束，后足胫节毛束极浓密，形成黑色毛块，跗节扁宽较短，侧面多毛。♂ 第二腹节侧面毛束发达，污白色。♂ 前翅极狭长，外缘浅弧形，极内倾，下端近臀角处有一裂口，后缘短。其长度与前缘长之比仅为 0.58:1；♀ 前翅正常。前翅灰黄绿至灰绿色，线纹黑褐至黑色，波状；亚基线一条，内线 2—3 条，中线两条，外线 3—4 条，内线、中线和外线和各线纹之间常散布灰褐色；中点黑色微小，短条形；亚缘线波曲，其内侧有两条不完整的黑线，外侧在脉间有一列黑点；缘线在翅脉端有一列黑点；缘毛灰褐色。后翅灰褐色，♂ 后翅端部分裂为三片，中间一片黑褐色，下片端部黄色掺杂黑鳞。翅反面灰褐色，前翅隐见正面斑纹。

雄性外生殖器 (图 253)：囊形突略延长。抱器背端突直立，长宽约相等。




图 253—254 雄性外生殖器. 253. 间三叶尺蛾 *Sauris interruptaria* (Moore);
254. 蛭三叶尺蛾 *S. hirudinata* Guenée

雌性外生殖器 (图 255): 囊导管短粗, 囊体肥大, 由囊导管中部至囊体近底部处内面均散布微刺。

检视标本: 2♀, 海南尖峰岭, 1982. IV. 6、27; 1♂1♀, 同前, 1983. V. 4。

分布: 台湾、海南; 日本, 越南, 菲律宾, 印度, 锡金, 斯里兰卡, 马来西亚, 印度尼西亚, 巴布亚新几内亚。

蛭三叶尺蛾 *Sauris hirudinata* (Guenée, 1857) (图版 V: 1)

Sauris hirudinata Guenée, 1857, in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes (Spec. gen. Lepid.) 10: 364.

Remodes abortivata Guenée, ibidem 10: 364.

Sauris remodesaria Walker, 1862, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 24: 1253.

Remodes lobata Warren, 1895, Novit. zool. 2: 107.

前翅长: ♂ ♀ 13 mm。头和胸部背面、前翅橄榄绿色。下唇须较前种略短, 约 2/3—3/4 伸出额外。触角黑灰色。♂ 中足胫节无毛束, 后足胫节毛束弱小, 浅灰褐色。♂ 第二腹节侧面毛束焦褐色。♂ 前翅中等宽度, 后缘与前缘长度之比约 0.62:1。前翅密布波状线纹; 亚基线灰褐色, 其它线纹深灰褐与绿色相间; 中线与外线间距离较其它线纹间距略宽, 中点黑灰色, 肾形; 缘线黑色, 纤细, 在翅脉端扩展成黑点; 缘毛基半部灰褐与灰黄色相间, 端半部灰白色。后翅灰褐色, ♀ 可见深色条形中点; ♂ 后翅端部分裂为三片, 中片黑褐色, 后缘附近深灰褐色。翅反面灰褐色。

雄性外生殖器 (图 254): 囊形突短。抱器瓣较前种宽阔, 抱器背端突平伏在抱器瓣上, 短钝角状。