

**桨三叶尺蛾 *Sauris remodesaria* Walker, 1862**

*Sauris remodesaria* Walker, 1862, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 24: 1253. (斯里兰卡)

*Remodes remodesaria*: Moore, 1887, Lepid. Ceylon 3: 484, pl. 207: 2, 3, 5.

前翅浅橄榄绿色；亚基线、中线和外线紫褐色波状，亚缘线锯齿形，缘线为一列黑点；中点半月形；各线纹之间灰黄色。后翅灰褐色；♂后翅端部三片叶瓣互相折叠，中部一片深灰褐色，其反面披褐色鳞毛。下唇须、头和胸部橄榄绿色；腹部和足浅灰褐色，前足背面褐色；触角黑褐色。♂♀翅展 28 mm。

未见标本。以上译自 Moore (1887) 并参考其彩图。模式标本保存在英国自然历史博物馆。

分布：海南；斯里兰卡。

**角三叶尺蛾 *Sauris angulosa* (Warren, 1896)**

*Remodes angulosa* Warren, 1896, Novit. zool. 3: 382. (印度尼西亚：安汶)

*Sauris angulosa*: Prout, 1930, Bull. Hill Mus. 4: 134.

前翅浅灰绿色，带橄榄色调，斑纹紫褐色；亚基线波状紫褐色，其外侧为两条宽阔锯齿形影状带；然后是一条浅色锯齿形带和深色中线，其外侧的锯齿形紫褐色双线构成中带内缘；中点短条形倾斜，紫褐色，与上述中带内缘接触；中带外缘为紫褐色深锯齿形双线，在前缘下方向外倾斜并由外侧绕过中室端；其外侧一条暗绿色锯齿形带，在前缘处宽阔，向下渐细成线，齿尖带紫褐色；该带外侧为一浅色带，带中部有一条暗绿色线；亚缘线浅绿色锯齿形，其内侧为一条暗绿色带，在翅脉间有紫褐色斑块，亚缘线外侧为一条紫褐色带；缘线在翅脉端有一列黑点；缘毛绿色。后翅灰褐色。翅反面深灰褐色。触角和下唇须黑色；头顶和胸部背面橄榄绿色；腹部浅灰褐色。

未见标本。上文译自 Warren (1896) 原记。模式标本 2♀产于印度尼西亚安汶，1892. II。翅展 34 mm。

分布：海南；印度尼西亚。

**狭带三叶尺蛾 *Sauris angustifasciata* (Inoue, 1976) (图版 V: 3)**

*Steirophoru angustifasciata* Inoue, 1976, Tinca 10: 13, figs 18, 19. (日本)

*Phthonoloba angustifasciata*: Inoue, 1977, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 13: 225.

*Sauris angustifasciata*: Inoue, 1982, Moths Japan 1: 470; 2: 276, pl. 67: 14, pl. 228: 53.

前翅长：♂♀13—14 mm。下唇须黑褐色，约 2/3 伸出额外。额灰绿色，触角及两触角基部之间黑褐色。头顶和胸部背面灰黄至灰绿色，肩片掺杂黑褐色。♂后足胫节正