

喙发达，头部毛粗，额上方有一尖毛簇；下唇须向上伸，第二、三节均长，但第三节较细尖，雄蛾触角双栉形直到端部，雌蛾触角锯齿形；颈板成兜状，中央脊形；胫节鳞片浓厚，雄蛾后足最末二跗节为鳞片所掩盖；腹部宽而扁，末端截成方形；翅较宽，前翅外缘中部凸出成一角，顶角很尖，顶角与中部凸角之间内凹。

棘翅夜蛾 *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus) (图版LVI-2)

Phalaena Bombyx libatrix Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 507. (欧洲)

Bombyx libatricus Haworth, 1803, Lep. Brit. p. 98.

Scoliopteryx libatrix: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 361, pl. 52m. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 159. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 171. —Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 292. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 362.

翅展 35 mm。头部褐色，雄蛾触角双栉形，下唇须第三节细长；胸部背面褐色；前翅灰褐色，布有黑褐色细点，翅基部、中室端部及中室后橘黄色，密布血红色细点，内线白色，自前缘脉外斜至中室前缘折向后，至中室后缘折角近呈直线外斜，环纹只现一白点，肾纹窄，灰色，不清晰，前后部各有一黑点，外线双线白色，线间暗褐色，在前缘脉上为一模糊白粗点，其后沿 9 脉强外伸折成一锐齿内斜，至中褶后稍内弯，3 脉后较直后行，亚端线白色，不规则波曲，在 3—4 脉间明显外凸，在前缘区白色明显，中室后缘及端区各翅脉白色，顶角外凸成齿，其后的翅外缘凹，外缘中部外凸成齿，其后的翅外缘锯齿形；后翅暗褐色，隐约可见黑褐色外线，自前缘后较直内斜，亚端线微弱；腹部灰褐色。

寄主 柳、杨。

分布 黑龙江、辽宁、陕西、河南、云南；日本，朝鲜，欧洲。

艳叶夜蛾属 *Eudocima* Billberg

Eudocima Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billbg. p. 85.

Type-species: *Phalaena salaminia* Cramer.

Elygea Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billbg. p. 85.

Leptophara Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billbg. p. 85.

Trissophaea Hübner, 1823, Verz. bek. Schmett. 16: 264.

Othreis Hübner, 1823, Verz. bek. Schmett. 16: 264.

Maenas Hübner, 1823, Verz. bek. Schmett. 16: 264.

Ophideres Boisduval, 1832, Voy. Dec. Astrolabe Ent. 1: 245.

Acacalis Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Index Univ. p. 1;