

细皮夜蛾属 *Selepa* Moore

Selepa Moore, 1858, in Horsefield et Moore, Cat. Lep. Ins. 2: 353.

Type-species: *Selepa celtis* Moore.

Detounda Walker, 1864, J. Linn. Soc. Zool. 7: 193.

喙发达，下唇须向前伸，上、下缘均饰毛，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部背面无毛簇；前足胫节两侧均饰长毛，跗节有鳞丛；前翅前后缘亚平行，有一极短副室，后翅5脉发达；腹部基部几节背面有毛簇。

细皮夜蛾 *Selepa celtis* Moore (图版 XLIV-4)

Selepa celtis Moore, 1858, in Horsefield et Moore, Cat. Lep. Mus. N. H. 2: 353. (爪哇)

Subrita curviferella Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1745.

Selepa celtis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 298, text fig. 105. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 396, pl. 37a. —Gardener, 1941, Ind. For. Red., Ent. 6: 276. —Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 96. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 339. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 791.

翅展 19—24mm。头部与胸部灰褐色杂棕色，前足跗节有灰黑色环；前翅灰色带棕色，密布黑棕色细点，内线暗棕色，波曲外弯，环纹为竖鳞组成的黑点，内侧衬白色，肾纹为竖鳞组成的黑色窄条，外线双线黑色，自前缘脉外弯至4脉后内弯，至3脉回向内伸并成单线，自2脉基部微曲外斜，其上有三簇竖鳞，2脉前后各有一细黑纵纹，亚端线黑棕色，外侧衬白色，自前缘脉后外弯，锯齿形，3脉后内弯，在臀角处有一簇竖鳞，端线黑色；后翅白色，端区稍褐色；腹部白色微带褐色。

寄主 芒果、枇杷、菠萝蜜、八宝树。

分布 河南、江苏、浙江、湖北、江西、福建、广东、广西、海南、四川；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，菲律宾。

癞皮夜蛾属 *Iscadia* Walker

Iscadia Walker, 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 11: 724

Type-species: *Iscadia aperta* Walker.

Gadirtha Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1079, 1102.

Triorbis Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 366.

Lophosema Schaus, 1910, Ann. Mag. nat. Hist. 8, 6: 204.

Lophosema Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 332.