

蔗蛙茎夜蛾 *Sesamia uniformis* (Dudgeon) (图版XXXVII-15)

Nonagria uniformis Dudgeon, 1905, J. Bomb. Soc. 16: 402. (印度)

Sesamia uniformis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 332, pl. 144, fig. 25. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 189, pl. 21b. —Wu, 1981, J. S. China Agric. Coll. 2 (3): 14.

翅展 32 mm。头部与胸部浅赭黄色微带褐色，下唇须外侧黑褐色，下缘白色，额带有黑褐色，雄蛾触角线形，有长纤毛丛，前、中足布有黑褐细点；前翅浅赭黄色，散布褐色细点，内区的亚中褶处有一黑点，中室后缘端部有黑褐影，中室下角及中室横脉外侧各有一黑点，外区在中褶与亚中褶处各有一黑点，其外方各翅脉上有不明显的一列黑点，端线黑色，缘毛微白；后翅白色；腹部赭白色。

雄蛾抱器瓣端钝圆，背侧有一突，阴茎端有齿突 (图 553)。




图 553 蔗蛙茎夜蛾 *Sesamia uniformis* (Dudgeon) ♂ 外生殖器

寄主 甘蔗、水稻、玉米、小麦、高粱等。

分布 云南；印度。

邪夜蛾属 *Argyrospila* Herrich-Schäffer

Argyrospila Herrich-Schäffer, (1851), Syst. Bearb. Schmett. Eur. p. 374.

Type-species: *Leucania maculata* Eversmann.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被毛和毛状鳞，前胸有散开型毛簇；前翅顶角稍尖，有一副室；后翅 6、7 脉共柄，5 脉弱。