

## 血斑夜蛾属 *Siglophora* Butler

*Siglophora* Butler, 1892, Proc. zool. Soc. Lond. p. 123.

Type-species: *Siglophora bella* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，额平滑，上部有鳞形脊；胸部具鳞片及毛，后胸有略扁毛簇，前足及中足胫节有毛，后足鳞片平滑，距长；腹部基部两节有毛簇；前翅3脉及4脉从中室下角伸出，8、9、10脉合一柄；后翅外缘较直，后缘长，形成臀角凸出，3、4脉合一柄，8脉从中室中部伸出。

### 种 检 索 表

1. 头顶有金色鳞脊 ..... 2  
    头顶无金色鳞脊 ..... 内黄血斑夜蛾 *Siglophora sanguinolenta*
2. 雄蛾前翅反面的前缘区中部有一隆起 ..... 锈血斑夜蛾 *S. ferreilutea*  
    雄蛾前翅反面的前缘区中部无隆起 ..... 洁血斑夜蛾 *S. bella*

### 锈血斑夜蛾 *Siglophora ferreilutea* Hampson (图版XXXVIII-10)

*Siglophora ferreilutea* Hampson, 1895, Trans. ent. Soc. p. 296. (锡金)

*Siglophora ferruginea* Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 206.

*Siglophora ferreilutea*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 472. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 294. —Gaede, 1937, ibid. 11: 418. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 22. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 801.

翅展 27 mm。头、胸及前翅黄色，前翅前缘区基部一血色点，基线、内线血红色，后者锯齿形，内方一血红带，双线间在亚中褶后成一盃形锈红斑，环纹不显，中线锈红色锯齿形，肾纹外缘锯齿形，外线双线锈红色，亚端线棕色锯齿形，翅外缘深棕色；后翅白色，外半大部带浅黄色，端区后半带红棕色；腹部褐黄色。雄蛾前翅反面前缘区中部隆起。

**分布** 云南；日本，锡金。

### 洁血斑夜蛾 *Siglophora bella* Butler (图版XXXVIII-11)

*Siglophora bella* Butler, 1892, Proc. zool. Soc. p. 124, pl. 6, fig. 2. (Borneo)

*Siglophora bella*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 473. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 418, pl. 39k.

翅展 24 mm。头、胸及腹部黄色，头顶有红鳞脊，胸背有褐斑；前翅红褐带黑色，前缘区大部黄色，后缘基部一红褐纹，基线棕色，内线不显，前端褐色，其后为一列褐曲纹，中线褐色波浪形，外线黑色，外侧有一锯齿形黑线，亚端线黄色锯齿形，内侧衬

黑色；后翅基半部白色半透明，外半部紫褐色，翅后赤褐色；腹部黄色，有红条纹。

**分布** 海南、四川；印度尼西亚。

### 内黄血斑夜蛾 *Siglophora sanguinolenta* (Moore) (图版XXXVIII-12)

*Chionomera sanguinolenta* Moore, 1888, Lep. Atk. p. 285. (大吉岭)

*Siglophora sanguinolenta*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 475. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 419. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 319.

翅展 20—24 mm。头、胸黄色有红斑；前翅内半黄色，外半赤褐色，基部有多条血红斜线及斑纹，翅外半前缘区有半圆形黄区，其中有血红色点纹，亚端区一隐约的血红线；后翅内半及前缘区白色，其余暗灰褐色；腹部白色，背面暗褐色。

**分布** 湖南、浙江、广西、四川、西藏；印度。

## 张夜蛾属 *Chandica* Moore

*Chandica* Moore, 1888, Lep. Atk. p. 286.

Type-species: *Chandica quadripennis* Moore.

喙不发达，短缩，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额光滑无突起，上部有毛脊，复眼大，雄蛾触角线形，较扁；胸部被毛和鳞片，有脊形毛簇，中足胫节内、外缘饰长毛，后足胫节细长而弯；前翅前缘近基部拱曲，中部微凹；后翅后外角长，外缘前半凹，中室后及后缘区有细毛，反面的前缘区有粗鳞，5脉发达，3、4、5脉共柄；腹部基节背面有鳞簇。

### 张夜蛾 *Chandica quadripennis* Moore (图版XXXVIII-13)

*Chandica quadripennis* Moore, 1888, Lep. Atk. p. 286. (大吉岭)

*Chaudica* [sic] *meekei* Warren, 1916, Nov. zool. 23: 214.

*Chandica quadripennis*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 478. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 319. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 96.

翅展 24—28 mm。头部黄色，额黑褐色；胸部红棕色，下胸白色；前翅红棕色，前缘区一列黄斑，其后缘衬深棕色，翅端区一黄带，内缘深棕色，内线、外线微白，后者锯齿形，在6脉前有楔形黑纹，端线为一列黑褐色点；后翅赭黄，端区带褐色，中段杂少许灰色，翅外缘前半凹，中后部外拱；腹部白色，背面带肉红色。

**分布** 广东、海南；锡金，印度。

## 表夜蛾属 *Titulcia* Walker

*Titulcia* Walker, 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 29. 810.