

血斑夜蛾属 *Siglophora* Butler

Siglophora Butler, 1892, Proc. zool. Soc. Lond. p. 123.

Type-species: *Siglophora bella* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，额平滑，上部有鳞形脊；胸部具鳞片及毛，后胸有略扁毛簇，前足及中足胫节有毛，后足鳞片平滑，距长；腹部基部两节有毛簇；前翅3脉及4脉从中室下角伸出，8、9、10脉合一柄；后翅外缘较直，后缘长，形成臀角凸出，3、4脉合一柄，8脉从中室中部伸出。

种 检 索 表

1. 头顶有金色鳞脊 2
 头顶无金色鳞脊 内黄血斑夜蛾 *Siglophora sanguinolenta*
2. 雄蛾前翅反面的前缘区中部有一隆起 锈血斑夜蛾 *S. ferreilutea*
 雄蛾前翅反面的前缘区中部无隆起 洁血斑夜蛾 *S. bella*

锈血斑夜蛾 *Siglophora ferreilutea* Hampson (图版XXXVIII-10)

Siglophora ferreilutea Hampson, 1895, Trans. ent. Soc. p. 296. (锡金)

Siglophora ferruginea Leech, 1899, Trans. ent. Soc. p. 206.

Siglophora ferreilutea: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 472. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 294. —Gaede, 1937, ibid. 11: 418. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 22. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 801.

翅展 27 mm。头、胸及前翅黄色，前翅前缘区基部一血色点，基线、内线血红色，后者锯齿形，内方一血红带，双线间在亚中褶后成一盃形锈红斑，环纹不显，中线锈红色锯齿形，肾纹外缘锯齿形，外线双线锈红色，亚端线棕色锯齿形，翅外缘深棕色；后翅白色，外半大部带浅黄色，端区后半带红棕色；腹部褐黄色。雄蛾前翅反面前缘区中部隆起。

分布 云南；日本，锡金。

洁血斑夜蛾 *Siglophora bella* Butler (图版XXXVIII-11)

Siglophora bella Butler, 1892, Proc. zool. Soc. p. 124, pl. 6, fig. 2. (Borneo)

Siglophora bella: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 473. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 418, pl. 39k.

翅展 24 mm。头、胸及腹部黄色，头顶有红鳞脊，胸背有褐斑；前翅红褐带黑色，前缘区大部黄色，后缘基部一红褐纹，基线棕色，内线不显，前端褐色，其后为一列褐曲纹，中线褐色波浪形，外线黑色，外侧有一锯齿形黑线，亚端线黄色锯齿形，内侧衬