

黑色；后翅基半部白色半透明，外半部紫褐色，翅后赤褐色；腹部黄色，有红条纹。

分布 海南、四川；印度尼西亚。

内黄血斑夜蛾 *Siglophora sanguinolenta* (Moore) (图版XXXVIII-12)

Chionomera sanguinolenta Moore, 1888, Lep. Atk. p. 285. (大吉岭)

Siglophora sanguinolenta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 475. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 419. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 319.

翅展 20—24 mm。头、胸黄色有红斑；前翅内半黄色，外半赤褐色，基部有多条血红斜线及斑纹，翅外半前缘区有半圆形黄区，其中有血红色点纹，亚端区一隐约的血红线；后翅内半及前缘区白色，其余暗灰褐色；腹部白色，背面暗褐色。

分布 湖南、浙江、广西、四川、西藏；印度。

张夜蛾属 *Chandica* Moore

Chandica Moore, 1888, Lep. Atk. p. 286.

Type-species: *Chandica quadripennis* Moore.

喙不发达，短缩，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额光滑无突起，上部有毛脊，复眼大，雄蛾触角线形，较扁；胸部被毛和鳞片，有脊形毛簇，中足胫节内、外缘饰长毛，后足胫节细长而弯；前翅前缘近基部拱曲，中部微凹；后翅后外角长，外缘前半凹，中室后及后缘区有细毛，反面的前缘区有粗鳞，5脉发达，3、4、5脉共柄；腹部基节背面有鳞簇。

张夜蛾 *Chandica quadripennis* Moore (图版XXXVIII-13)

Chandica quadripennis Moore, 1888, Lep. Atk. p. 286. (大吉岭)

Chaudica [sic] *meeki* Warren, 1916, Nov. zool. 23: 214.

Chandica quadripennis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 478. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 319. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 96.

翅展 24—28 mm。头部黄色，额黑褐色；胸部红棕色，下胸白色；前翅红棕色，前缘区一列黄斑，其后缘衬深棕色，翅端区一黄带，内缘深棕色，内线、外线微白，后者锯齿形，在6脉前有楔形黑纹，端线为一列黑褐色点；后翅赭黄，端区带褐色，中段杂少许灰色，翅外缘前半凹，中后部外拱；腹部白色，背面带肉红色。

分布 广东、海南；锡金，印度。

表夜蛾属 *Titulcia* Walker

Titulcia Walker, 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 29. 810.