

种 检 索 表

1. 前翅有暗纵纹 辉刀夜蛾 *Simyra albovenosa*
 前翅无暗纵纹 2
2. 前翅翅脉衬暗纹 刀夜蛾 *S. nervosa*
 前翅翅脉不衬暗纹 亮刀夜蛾 *S. splendida*

刀夜蛾 *Simyra nervosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 III-23)

Noctua nervosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wiem. p. 85. (奥地利)

Simyra nervosa: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 174, text fig. 27. — Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 12, pl. 2e. — Kozhantschikov, 1950, Fn. SSSR, 12: 561, figs. 294—295. — Chen, 1982, Icon, Het. Sin. 3: 246, pl. 78, fig. 1778.

翅展 39mm。全体白色,雄蛾触角双栉形,前翅端区微带褐黄色,翅脉均衬黑灰色,并散布细黑点;后翅端区微带褐黄色,并布有细黑点。雄蛾抱钩分叉,背一支长,阳茎长(图 49)。




图 49 刀夜蛾 *Simyra nervosa* (Denis et Schiffermüller) ♂ 外生殖器

寄主 大戟科、酸模等。

分布 新疆;欧洲。

亮刀夜蛾 *Simyra splendida* Staudinger (图版 III-24)

Simyra splendida Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 245. (Viadivostok)

Simyra splendida: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 175. — Warren, 1909, in Seitz,

Macrolep. World 3: 12, pl. 2e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 246, pl. 78, fig. 1779

翅展 39—41mm。全体白色，头顶、颈板及翅基片基部黑灰色，前翅密布细黑点，后翅除顶角、外缘及臀角外均布细黑灰点，腹部有黑灰毛。

分布 黑龙江、新疆、河北、青海；朝鲜，俄罗斯。

辉刀夜蛾 *Simyra albovenosa* (Goeze) (图版 III-25)

Phalaena Noctua albovenosa Goeze, 1781, Ent. Beytr. p. 251. (未注明模式产地)

Phalaena venosa Borkhausen, 1792, Naturg. eur. Schmett. p. 716.

Arsilonche albovenosa: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 12, pl. 2e. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lepid. Noct. 4: 8.

Simyra albovenosa: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 177, text, fig. 28.

翅展 31—43mm。全体白色带浅褐黄色，前翅有细褐点，亚中褶一褐纵条，中室另一褐纵条伸达外缘，在中室外分为二，端区各翅脉间有褐纵纹。雄蛾抱钩长，伸出瓣外，阴茎有几个棘形角状器（图 50）。




图 50 辉刀夜蛾 *Simyra albovenosa* (Goeze) ♂ 外生殖器

寄主 芦竹等。云南、贵州报道此虫为害水稻。

分布 新疆、贵州、云南；欧洲。

梦夜蛾属 *Subleuconycta* Kozhantschikov

Subleuconycta Kozhantachikov, 1950, Fn. SSSR 12: 447.

Type-species: *Leuconycta palshkovi* Filipjev.