

**花豹夜蛾 *Sinna floralis* Hampson (图版 XXXVIII-8)**

*Sinna floralis* Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 16: 602. (马来西亚)

*Sinna floralis*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 466, pl. 186, fig. 21. —

Barlow, 1983, Moths S. E. Asia p. 94, pl. 30, fig. 1.

体长 15mm; 翅展 35 mm。头部与胸部黄色, 触角和下唇须第三节黑色, 颈板有红纹, 胸部背面中央及翅基片有红纵条, 下胸与足白色; 前翅浅黄色, 前缘脉中部至 2 脉端部的外方黄色, 基线、内线及中线均为红色外斜条, 后半分化相交, 组成网状斑纹, 三线的前端均黑色, 外线的后端伸达臀角, 在亚中褶处杂有黑色纹, 顶角区有 3 个黑斑, 翅外缘近中部和亚中褶处各有一黑斑, 缘毛黄白色, 但在各黑斑外带黑色; 后翅黄白色; 腹部白色, 腹面近端部有一黑色宽带。

**分布** 云南; 马来西亚, 印度尼西亚。

**砌石夜蛾属 *Gabala* Walker**

*Gabala* Walker, [1866] 1865, List Spce. Lep. Colln Br. Mus. 34: 1220.

Type-species: *Gabala polyspilalis* Walker.

喙不发达, 很小, 下唇须斜向上伸, 第二节远超过头顶, 前端上方有一撮毛, 第三节很长, 前端有毛簇, 额平滑, 上部有鳞脊, 复眼圆大, 雄蛾触角丝状; 胸部几全被鳞片, 后胸有竖起毛簇; 胫节鳞片光滑; 腹部仅基部两节有毛簇; 雄蛾腹侧面有由大鳞组成的扇形构造遮住气门; 前翅前缘很拱曲, 顶角微凸出, 外缘曲度平稳, 不成锯齿形。

**银斑砌石夜蛾 *Gabala argentata* Butler (图版 XXXVIII-9)**

*Gabala argentata* Butler, 1818, Ill. Het. Br. Mus. 2: 56, pl. 39, fig. 3. (日本横滨)

*Gabala argentata*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 471. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 418. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 319.

翅展 26—30 mm。头、胸及前翅赤褐色, 头顶有一银色斑, 周围血红色, 颈板、翅基片及前后胸均有砌石状赤褐边白纹, 下胸与足白色, 前翅基部有许多银白斑, 均围以赤褐色, 大小不一, 外线隐约可见双线赤褐色波浪形, 4 脉后内弯, 中段在各翅脉间有黑点, 顶角有几个围以赤褐色的银白斑, 亚端线银白色, 波浪形, 仅中段可见, 衬以赤褐色, 端线黑褐色, 缘毛赤褐色, 臀角外浅褐色; 后翅白色带淡褐色, 翅外缘前半带赤褐色; 腹部背面白色带褐色, 毛簇赤褐色。

**寄主** 盐肤木。

**分布** 浙江、湖南、江西、广东、海南、西藏; 日本, 朝鲜, 印度, 缅甸。