

前缘一白点，中室端有一黑纹，外线黑色，在翅脉上为黑点，前端一白点，线外侧另有一列白点，亚端线黑色，在5—7脉间为斑状，端线为一列黑点；后翅赤褐色，后缘区中部有一黑斑，外线为一列黑点，臀角有一黑斑，翅外缘一列白点一列黑点。

分布 广东、海南、云南；斯里兰卡，南太平洋若干岛屿。

瑕夜蛾属 *Sinocharis* Püngeler

Sinocharis Püngeler, 1912, Mitt. munch. ent. Ges. 3: 7.

Type-species: *Sinocharis korbae* Püngeler.

Noshimea Matsumura, 1931, Ins. Mats. 6: 210.

喙发达，下唇须短，向上伸达头顶，额平滑，触角线形；胸部被鳞扁平；腹部被毛；后足胫节有距两对；前翅顶角较圆。

瑕夜蛾 *Sinocharis korbae* Püngeler (图版XLI-1)

Sinocharis korbae Püngeler, 1912, Mitt. munch. ent. Ges. 3: 7. (Kasakewitsch)

Noshimea fulgularis Matsumura, 1931, Ins. Mats. 5: 210.

Sinocharis korbae: Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 208, pl. 23b. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 154. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 82. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 334. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 824.

翅展 39 mm。头部深棕色杂少许白色，额下部白色；胸部黄白色杂有少许黑色，足外侧黑色，有白色斑纹；前翅白色，内线内方黑色，基线白色曲折，内线中部内弯，外线双线黑色，自前缘脉外斜至4脉近端部，折角内弯，外线外方黑褐色，亚端线白色，前段不规则锯齿形，中段较直，后段内弯，端线白色，缘毛黑褐色；后翅白色，顶角及其外缘毛黑褐色；腹部白色，背面有灰色毛。

寄主 大丽花。

分布 黑龙江、吉林；日本，朝鲜等。

兰纹夜蛾属 *Stenoloba* Staudinger

Stenoloba Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 381.

Type-species: *Dichagyris jankowskii* Oberthür.

Neothripa Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 382.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，额有尖锥形突起，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部全被鳞片，前胸有斜立的长扁毛簇，后胸有散开毛簇；前足胫节有长