

翅展 41 mm。头部与胸部白色，下唇须上缘黑褐色，下胸与足淡褐色，腿节与胫节杂有黑褐色；前翅白色，除端区外均带淡褐色，一赭黄条自前缘脉中部伸达肾纹内侧，肾纹微黑，白边，肾纹外方及后方色较暗，隐约可见锯齿形外线，在 1—4 脉上为黑点，近顶角有一赭褐色斑，其内缘半圆形，外缘成一尖突，后半带有黑色，亚端线由不规则形黑纹组成，自顶角至 3 脉，在 6 脉处很宽，端线仅在 5 脉前可见黑色；后翅浅黄色，亚端区隐约可见雾状黑纹；腹部浅黄褐色。

雄性外生殖器的钩形突粗长，抱器瓣宽，端部钝圆，腹缘近端部有明显凹陷，抱钩粗，端部膨大成球棒形，阳茎粗，内囊有一粗棘形长角状器（图 561）。

分布 湖北。

### 日月明夜蛾 *Sphragifera biplagiata* (Walker) (图版 XXXVII-32)

*Acontia biplagiata* Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 781. (华北)

*Acontia biplaga* Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus 12: 795. (preoccupied)

*Chasmina biplaga*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 357. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 277.

*Sphragifera biplaga*: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 787.

翅展 28—38 mm。头、胸及前翅白色，额有一黑横纹，前翅后半及端区带土灰色，前缘脉基部一褐点，中部一赤褐斜斑，其后端达中室下角，近顶角一赤褐曲斑，亚端线白色，肾纹黑褐色白边，似 8 字形，外侧一黑褐斑，翅外缘一列黑点；后翅黄白色，外半带褐色；腹部浅褐色，基部微白。

分布 河北、河南、湖北、湖南、江苏、浙江、福建、贵州；日本，朝鲜。

### 斑明夜蛾 *Sphragifera maculata* (Hampson) (图版 XXXVII-33)

*Leocyma maculata* Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 290. (缅甸)

*Ohasmina maculata*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 356. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 277.

翅展 27—34 mm。头部淡黄褐色，下唇须第一、二节后缘黑色；胸部背面淡黄褐色，前足跗节褐色，各节间有白环；前翅褐黄色，内线细弱，双线，褐色波浪形外斜，在前缘脉上现二暗褐点，环纹小，圆形，褐色，肾纹巨大，褐色，扁圆形，后端稍波曲，前方有一黑纹，后方有黑褐线，外线双线褐色，波浪形外弯，曲度平稳，在前缘脉上稍黑，后端近达臀角，端线褐色，翅外缘有一列褐点；后翅暗褐色，翅外缘有一列黑褐点，缘毛端部淡褐黄色；腹部黄褐色。

分布 四川；缅甸。