前翅长：♂16—17 mm，♀17 mm。头灰褐色，额边缘白色。下唇须深褐色，鳞毛粗糙，尖端未到达额外。胸腹部背面灰褐色。翅暗黄色，斑纹深褐色。前翅前缘各斑间灰白色，翅基部散布灰褐色，并向外扩展到 Cu_2 基部；外斑到达 M_2 或 M_3，其外缘平直，内缘常不完整，使外斑内侧下半段减弱甚至缺失；缘斑在 M_2 下方消失；各斑上均有少量灰白色短条状斑。后翅基部灰褐色扩展至外线处；缘斑细带状，在顶角附近略粗，并越过顶角到达前缘外 1/3 处。前后翅缘毛深褐色与白色相间。前翅反面同正面，各斑上白色短条状斑增多。后翅反面灰白色与深褐色斑杂，外线处为一灰白色带。前翅 M_1 与径副室下缘共柄。

雄性外生殖器（图 297）：背兜特别短宽，钩形突粗大。阳端基环上端由两上角内倾下凹至中央，呈浅漏头状，侧缘弧形，下端稍尖。囊形突特别短平。抱器瓣端部宽，但较污四斑尺蛾略窄；抱器背缘中部隆起平缓；抱器内突小。角状器长大。

雌性外生殖器（图 301）：囊导管由前阴片至骨环一段较本属其它种细长，骨环小。囊体瘦小。囊片圆形，中央形成一锥状小突，位于囊体腹面中上部。

♂第八腹节腹板（图 286：h）：近似污四斑尺蛾。略小，上端两尖角间距较宽。

检视标本：5 ♂（正模和副模），西藏林周县，4 200 m，1960. Ⅵ. 13；1♀（配模），2 ♂（副模），西藏仁布帕当，1978. Ⅶ. 8。

分布：西藏。

屏四斑尺蛾 *Stamnodes pauperaria*（Eversmann，1848）

Fidonia pauperaria Eversmann，1848，Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 21（3）：224.（俄罗斯：Steppen der Songarei）

Stamnodes pauperaria：Guenée，1857，in Boisduval & Guenée，Hist. nat. Insectes（Spec. gén. Lépid.）10：515.

分布：西藏；中亚地区。

本种广泛分布于亚洲中部，中国记述下述亚种。

喜马拉雅亚种 subsp. *pamphilata*（Felder，1875）（图版Ⅴ：22）

Cidaria pamphilata Felder，1875，Reise Novara，pl. 132：34.（喜马拉雅山西北部）

Stamnodes pamphilata：Hampson，1895，Fauna Br. India（Moths）3：423，fig. 198.

Stamnodes pauperaria pamphilata：Djakonov，1915，Rev. Russe d'Ent. 15：488.

前翅长：♂16 mm，♀19 mm。额及头顶黄褐色。下唇须灰白色，♀色略深，尖端未伸出额外。前翅淡黄色，斑纹深褐色，前缘各斑之间灰白色；翅基部的灰褐色向外扩展至 Cu_2 基部，♀较明显；外斑伸达 M_2；缘斑在 Cu_1 处消失或窄缩成细线至臀角。后翅淡黄色，翅基部的灰褐色扩展到 Cu_1 基部之外，缘线消失（♂）或有深褐色缘线

前翅长：♂16—17 mm，♀17 mm。头灰褐色，额边缘白色。下唇须深褐色，鳞毛粗糙，尖端未到达额外。胸腹部背面灰褐色。翅暗黄色，斑纹深褐色。前翅前缘各斑间灰白色，翅基部散布灰褐色，并向外扩展到 Cu_2 基部；外斑到达 M_2 或 M_3，其外缘平直，内缘常不完整，使外斑内侧下半段减弱甚至缺失；缘斑在 M_2 下方消失；各斑上均有少量灰白色短条状斑。后翅基部灰褐色扩展至外线处；缘斑细带状，在顶角附近略粗，并越过顶角到达前缘外 1/3 处。前后翅缘毛深褐色与白色相间。前翅反面同正面，各斑上白色短条状斑增多。后翅反面灰白色与深褐色斑杂，外线处为一灰白色带。前翅 M_1 与径副室下缘共柄。

雄性外生殖器（图 297）：背兜特别短宽，钩形突粗大。阳端基环上端由两上角内倾下凹至中央，呈浅漏头状，侧缘弧形，下端稍尖。囊形突特别短平。抱器瓣端部宽，但较污四斑尺蛾略窄；抱器背缘中部隆起平缓；抱器内突小。角状器长大。

雌性外生殖器（图 301）：囊导管由前阴片至骨环一段较本属其它种细长，骨环小。囊体瘦小。囊片圆形，中央形成一锥状小突，位于囊体腹面中上部。

♂第八腹节腹板（图 286：h）：近似污四斑尺蛾。略小，上端两尖角间距较宽。

检视标本：5 ♂（正模和副模），西藏林周县，4 200 m，1960. Ⅵ. 13；1♀（配模），2 ♂（副模），西藏仁布帕当，1978. Ⅶ. 8。

分布：西藏。

屏四斑尺蛾 *Stamnodes pauperaria*（Eversmann，1848）

Fidonia pauperaria Eversmann，1848，Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 21（3）：224.（俄罗斯：Steppen der Songarei）

Stamnodes pauperaria：Guenée，1857，in Boisduval & Guenée，Hist. nat. Insectes（Spec. gén. Lépid.）10：515.

分布：西藏；中亚地区。

本种广泛分布于亚洲中部，中国记述下述亚种。

喜马拉雅亚种 subsp. *pamphilata*（Felder，1875）（图版Ⅴ：22）

Cidaria pamphilata Felder，1875，Reise Novara，pl. 132：34.（喜马拉雅山西北部）

Stamnodes pamphilata：Hampson，1895，Fauna Br. India（Moths）3：423，fig. 198.

Stamnodes pauperaria pamphilata：Djakonov，1915，Rev. Russe d'Ent. 15：488.

前翅长：♂16 mm，♀19 mm。额及头顶黄褐色。下唇须灰白色，♀色略深，尖端未伸出额外。前翅淡黄色，斑纹深褐色，前缘各斑之间灰白色；翅基部的灰褐色向外扩展至 Cu_2 基部，♀较明显；外斑伸达 M_2；缘斑在 Cu_1 处消失或窄缩成细线至臀角。后翅淡黄色，翅基部的灰褐色扩展到 Cu_1 基部之外，缘线消失（♂）或有深褐色缘线