

前翅长: ♂ 16—17 mm, ♀ 17 mm。头灰褐色, 额边缘白色。下唇须深褐色, 鳞毛粗糙, 尖端未到达额外。胸腹部背面灰褐色。翅暗黄色, 斑纹深褐色。前翅前缘各斑间灰白色, 翅基部散布灰褐色, 并向外扩展到 Cu_2 基部; 外斑到达 M_2 或 M_3 , 其外缘平直, 内缘常不完整, 使外斑内侧下半段减弱甚至缺失; 缘斑在 M_2 下方消失; 各斑上均有少量灰白色短条状斑。后翅基部灰褐色扩展至外线处; 缘斑细带状, 在顶角附近略粗, 并越过顶角到达前缘外 $1/3$ 处。前后翅缘毛深褐色与白色相间。前翅反面同正面, 各斑上白色短条状斑增多。后翅反面灰白色与深褐色斑杂, 外线处为一灰白色带。前翅 M_1 与径副室下缘共柄。

雄性外生殖器 (图 297): 背兜特别短宽, 钩形突粗大。阳端基环上端由两上角内倾下凹至中央, 呈浅漏头状, 侧缘弧形, 下端稍尖。囊形突特别短平。抱器瓣端部宽, 但较污四斑尺蛾略窄; 抱器背缘中部隆起平缓; 抱器内突小。角状器长大。

雌性外生殖器 (图 301): 囊导管由前阴片至骨环一段较本属其它种细长, 骨环小。囊体瘦小。囊片圆形, 中央形成一锥状小突, 位于囊体腹面中上部。

♂ 第八腹节腹板 (图 286: h): 近似污四斑尺蛾。略小, 上端两尖角间距较宽。

检视标本: 5 ♂ (正模和副模), 西藏林周县, 4 200 m, 1960. VI. 13; 1 ♀ (配模), 2 ♂ (副模), 西藏仁布帕当, 1978. VII. 8。

分布: 西藏。

屏四斑尺蛾 *Stamnodes pauperaria* (Eversmann, 1848)

Fidonia pauperaria Eversmann, 1848, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 21 (3): 224. (俄罗斯: Steppen der Songarei)

Stamnodes pauperaria: Guenée, 1857, in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes (Spec. gén. Lépid.) 10: 515.

分布: 西藏; 中亚地区。

本种广泛分布于亚洲中部, 中国记述下述亚种。

喜马拉雅亚种 *subsp. pamphilata* (Felder, 1875) (图版 V: 22)

Cidaria pamphilata Felder, 1875, Reise Novara, pl. 132: 34. (喜马拉雅山西北部)

Stamnodes pamphilata: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 423, fig. 198.

Stamnodes pauperaria pamphilata: Djakonov, 1915, Rev. Russe d'Ent. 15: 488.

前翅长: ♂ 16 mm, ♀ 19 mm。额及头顶黄褐色。下唇须灰白色, ♀ 色略深, 尖端未伸出额外。前翅淡黄色, 斑纹深褐色, 前缘各斑之间灰白色; 翅基部的灰褐色向外扩展至 Cu_2 基部, ♀ 较明显; 外斑伸达 M_2 ; 缘斑在 Cu_1 处消失或窄缩成细线至臀角。后翅淡黄色, 翅基部的灰褐色扩展到 Cu_1 基部之外, 缘线消失 (♂) 或有深褐色缘线