



图 292—295 雌性外生殖器. 292. 南山黄四斑尺蠖 *Stamnodes danilovi djakonovi* Alphéraky;  
293. 西藏白四斑尺蠖 *S. depeculata thibetaria* Oberthür; 294. 集红四斑尺蠖  
*S. lusoria* Prout; 295. 江达四斑尺蠖 *S. jomdensis* Xue

显隆起。

雌性外生殖器 (图 295): 近似集红四斑尺蠖。但囊片细带状, 位于囊体底部, 其长度近于集红四斑尺蠖的 2 倍。

♂ 第八腹节腹板 (图 286: f): 上半段同集红四斑尺蠖, 中上部以下逐渐加宽, 宽比长约为 3/4。

检视标本: 1 ♂ (正模)、1 ♂ 1 ♀ (副模), 西藏江达, 3 400 m, 1976. VII. 24、26; 1 ♀ (配模)、1 ♂ 1 ♀ (副模), 西藏左贡, 3 800 m, 1976. VI. 24、29; 1 ♀, 西藏芒康通海, 3 250 m, 1982. VIII. 8。

分布: 西藏。

#### 污四斑尺蠖 *Stamnodes squalidus* Xue, 1986 (图版 V: 20)

*Stamnodes squalidus* Xue, 1986, Sinozoologia 4: 193, fig. 3. (西藏: 聂拉木)

前翅长: ♂ 14—16 mm, ♀ 16—17 mm。额及头顶灰褐色, 额边缘白色。下唇须尖端伸达额外, 第一、二节白色掺杂少量褐色鳞毛, 十分粗糙; 第三节灰褐色, 光滑。胸腹部背面深灰褐色。翅浅污黄色, 斑纹灰褐至褐色。前翅基部略带灰褐色; 中斑小; 外斑狭窄, 伸达  $M_3$ , 有时可达  $Cu_1$ , 其外缘在  $M_2$  处或略下方有一明显折角, 内缘直; 前

前翅长: ♂ 16—17 mm, ♀ 17 mm。头灰褐色, 额边缘白色。下唇须深褐色, 鳞毛粗糙, 尖端未到达额外。胸腹部背面灰褐色。翅暗黄色, 斑纹深褐色。前翅前缘各斑间灰白色, 翅基部散布灰褐色, 并向外扩展到  $Cu_2$  基部; 外斑到达  $M_2$  或  $M_3$ , 其外缘平直, 内缘常不完整, 使外斑内侧下半段减弱甚至缺失; 缘斑在  $M_2$  下方消失; 各斑上均有少量灰白色短条状斑。后翅基部灰褐色扩展至外线处; 缘斑细带状, 在顶角附近略粗, 并越过顶角到达前缘外  $1/3$  处。前后翅缘毛深褐色与白色相间。前翅反面同正面, 各斑上白色短条状斑增多。后翅反面灰白色与深褐色斑杂, 外线处为一灰白色带。前翅  $M_1$  与径副室下缘共柄。

雄性外生殖器 (图 297): 背兜特别短宽, 钩形突粗大。阳端基环上端由两上角内倾下凹至中央, 呈浅漏头状, 侧缘弧形, 下端稍尖。囊形突特别短平。抱器瓣端部宽, 但较污四斑尺蛾略窄; 抱器背缘中部隆起平缓; 抱器内突小。角状器长大。

雌性外生殖器 (图 301): 囊导管由前阴片至骨环一段较本属其它种细长, 骨环小。囊体瘦小。囊片圆形, 中央形成一锥状小突, 位于囊体腹面中上部。

♂ 第八腹节腹板 (图 286: h): 近似污四斑尺蛾。略小, 上端两尖角间距较宽。

检视标本: 5 ♂ (正模和副模), 西藏林周县, 4 200 m, 1960. VI. 13; 1 ♀ (配模), 2 ♂ (副模), 西藏仁布帕当, 1978. VII. 8。

分布: 西藏。

### 屏四斑尺蛾 *Stamnodes pauperaria* (Eversmann, 1848)

*Fidonia pauperaria* Eversmann, 1848, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 21 (3): 224. (俄罗斯: Steppen der Songarei)

*Stamnodes pauperaria*: Guenée, 1857, in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes (Spec. gén. Lépid.) 10: 515.

分布: 西藏; 中亚地区。

本种广泛分布于亚洲中部, 中国记述下述亚种。

### 喜马拉雅亚种 subsp. *pamphilata* (Felder, 1875) (图版 V: 22)

*Cidaria pamphilata* Felder, 1875, Reise Novara, pl. 132: 34. (喜马拉雅山西北部)

*Stamnodes pamphilata*: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 423, fig. 198.

*Stamnodes pauperaria pamphilata*: Djakonov, 1915, Rev. Russe d'Ent. 15: 488.

前翅长: ♂ 16 mm, ♀ 19 mm。额及头顶黄褐色。下唇须灰白色, ♀ 色略深, 尖端未伸出额外。前翅淡黄色, 斑纹深褐色, 前缘各斑之间灰白色; 翅基部的灰褐色向外扩展至  $Cu_2$  基部, ♀ 较明显; 外斑伸达  $M_2$ ; 缘斑在  $Cu_1$  处消失或窄缩成细线至臀角。后翅淡黄色, 翅基部的灰褐色扩展到  $Cu_1$  基部之外, 缘线消失 (♂) 或有深褐色缘线