

陋夜蛾属 *Hypenomorpha* Sugi

Hypenomorpha Sugi, 1977, Kontyu 45: 219.

Type-species: *Hypena falcipennis* Inoue.

喙发达，下唇须向前平伸，第三节基部有长鳞毛，端部尖，复眼大，圆形，触角线形，额光滑无突起，胸部只被鳞片；前翅稍窄，顶角尖，其后的外缘微凹，8、9脉共柄，无副室，后翅外缘中部微凹，5脉发达，自中室下角略前处发出；腹部背面无毛簇，钩形突长，端部尖，抱器瓣向端渐窄，背缘近端部拱曲。

斜线陋夜蛾 *Hypenomorpha calamina* (Butler) (图版 LXVI-35)

Hormisa calamina Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 446. (日本)

Hypena falcipennis ssp. *longifascia* Inoue, 1958, Check List Lep. 5: 603.

Rhynchina calamina: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 650. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 429, pl. 75b.

Hypenomorpha calamina: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 901, pl. 220, figs. 34—35.

翅展 22 mm。头部与胸部乳白色；前翅乳白色布有暗褐细点，肾纹只现二黑点，近翅外缘有一列黑点，一暗褐线自顶角内斜至中褶；后翅乳白色；腹部乳白色。

寄主 栎。

分布 湖南；日本。

轧夜蛾属 *Stenhypena* Hampson

Stenhypena Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 2: 93.

Type-species: *Hypena adustalis* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节超过头顶，上缘饰长毛，雄蛾触角线形，额上部有一尖毛簇；胸部被鳞片；前翅窄长，前、后缘亚平行，外缘较直，有一小副室，中室端部有稍竖立的鳞片；后翅3、4脉及6、7脉分别共一短柄。

轧夜蛾 *Stenhypena adustalis* (Hampson) (图版 LXVI-36)

Hypena adustalis Hampson, 1893, Ill. Het. 9: 120, pl. 166, fig. 7. (斯里兰卡)

Stenhypena adustalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 93, fig. 43.

翅展 32 mm。头部、胸部与前翅黄褐色，布有黑褐细点，部分带有黑褐色，中室色较暗，隐约可见黑褐色外线，微波浪形外弯，亚端区有一列细白点，列成波曲亚端线，翅外缘有一列黑点；后翅与腹部暗褐色。

分布 西藏；斯里兰卡。

卜夜蛾属 *Bomolocha* Hübner

Bomolocha Hübner, [1825] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 343.

Type-species: *Phalaena crassalis* Fabricius.

雄蛾触角有细微的纤毛，额上方有一尖形毛簇。胸部鳞片平滑。腹部背面有许多毛簇。中后足胫节微有毛。前翅顶角较尖而下垂。

种 检 索 表

1. 前翅黑褐大斑达翅后缘 2
前翅黑褐大斑不达翅后缘 5
2. 大斑外缘直 白斑卜夜蛾 *Bomolocha albopunctalis*
大斑外缘波曲 3
3. 大斑外缘在中褶处外突 4
大斑外缘在中褶及亚中褶外突 分色卜夜蛾 *B. bipartita*
4. 大斑外缘后半直 阴卜夜蛾 *B. stygiana*
大斑外缘后半斜 缩卜夜蛾 *B. obductalis*
5. 大斑伸近顶角 6
大斑不伸近顶角 8
6. 大斑后缘中部拱曲 显卜夜蛾 *B. perspicua*
大斑后缘与翅平行 7
7. 后翅端区白色 双色卜夜蛾 *B. bicoloralis*
后翅端区粉褐色 张卜夜蛾 *B. rhombalis*
8. 前翅外缘在中褶处外突 9
前翅外缘在中褶及亚中褶外突 锯卜夜蛾 *B. semialbata*
9. 前翅黑褐大斑的外后角弧形 10
前翅黑褐大斑的外后角非弧形 污卜夜蛾 *B. squalida*
10. 大斑外缘达亚端区 满卜夜蛾 *B. mandaria*
大斑外缘达外区 齐卜夜蛾 *B. zilla*

白斑卜夜蛾 *Bomolocha albopunctalis* (Leech) (图版 LXVI-37)

Hypena albopunctalis Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 557, pl. 52, fig. 10. (日本)

Hypena albopunctalis: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 656.

Bomolocha albopunctalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433. —Draudt, 1950,

Mitt. munch. ent. Ges. 40: 173. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 910, pl. 222,