

毛，中后足胫节毛中常；腹部有毛簇；前翅狭长，前后缘亚并行，顶角较钝，外缘曲度平稳，非锯齿形，有副室；后翅5脉发达，从中室外缘后方伸出。

种 检 索 表

1. 前翅中脉有白纹 2
前翅中脉无白纹 3
2. 前翅中脉白纹粗，伸达顶角 兰纹夜蛾 *Stenoloba jankowskii*
前翅中脉白纹细，不伸达顶角 交兰纹夜蛾 *S. confusa*
3. 前翅基区白色 4
前翅基区非白色 5
4. 前翅亚端线后端外侧有白斑 内斑兰纹夜蛾 *S. basiviridis*
前翅亚端线后端外侧无白斑 海兰纹夜蛾 *S. marina*
5. 前翅霉绿色 刘兰纹夜蛾 *S. liuii*
前翅非霉绿色 6
6. 前翅基部有一白纹，横线不清 灰兰纹夜蛾 *S. oculata*
前翅基部无白纹，横线清晰 细兰纹夜蛾 *S. clara*

交兰纹夜蛾 *Stenoloba confusa* (Leech) (图版 XLI-2)

Moma confusa Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 480, pl. 50, fig. 5. (日本)

Stenoloba confusa: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 799. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World, 3: 273. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 328.

Lophonycta confusa: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 682.

翅展 34—36 mm。头、胸白色，头顶及额有黑点纹，颈板有黑斑，胸背杂有黑色及黑纹；前翅黑褐色，基部有一“人”形白纹，两侧衬有黑线，内线、中线白色，与中室前、后缘的白纹组成不规则网状，中室中部一白色内斜纹，中室端部一白纹外斜新月形纹，亚端线黑色锯齿形，端线为一列衬白的黑纹，臀角有一粗白点；后翅白色，端区带有褐色，外线隐约可见；腹部白色带褐色。

分布 浙江、湖南、福建、广西、四川、云南；日本。

内斑兰纹夜蛾 *Stenoloba basiviridis* Draudt (图版 XLI-3)

Stenoloba basiviridis Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 131, pl. 8, fig. 19. (天目山)

Stenoloba basiviridis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 120. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.528.

翅展 25—28 mm。头与颈板黄白色，额有黑斑；胸部黑色杂灰、白色；前翅黑灰色，基部一白点，近基部有一乳白色大斑，自前缘脉至1脉后呈外斜，其外缘波浪形，