

前缘脉外斜至9脉后外弯，3脉后内弯，线外侧在中褶与亚中褶处衬白色，亚端线黑褐色，外侧衬白色，在中褶与亚中褶处内突，其内侧有黑纹；后翅黑褐色；腹部褐色。

雄蛾抱器瓣背腹缘近平行，端缘圆钝，有冠刺，阳茎内囊有一棘形角状器（图570）。

正模♂，海南尖峰岭，1993. VIII. 9，刘元福采。

本种略似 *Stenoloba prasinana* Warren，但前翅仅部分带绿色，肾纹前方无白斑。

灰兰纹夜蛾 *Stenoloba oculata* Draudt (图版XLI-6)

Stenoloba oculata Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 132, pl. 8, fig. 20. (衡山, 天目山)

Stenoloba oculata: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 120.

翅展23 mm。头部暗褐色杂有黄白色；胸部暗褐色，翅基片黄白色，基部杂有赭红色；前翅鼠灰色，基部一白色纹，有褐色小斑，外外侧有二黄色曲纹，肾纹由黑鳞组成，外线微白，仅在2脉后可见，其后端外方有一白斑，斑的外半部带有锈红色，顶角有一浅灰色纹，臀角微现灰色；后翅暗灰褐色；反面色微白，可见三条暗褐色弧形线及暗褐色横脉纹；腹部暗褐灰色。雄蛾抱器瓣端缘斜（图571）。




图571 灰兰纹夜蛾 *Stenoloba oculata*
Draudt ♂外生殖器

分布 江苏、浙江、湖南、江西；日本。

细兰纹夜蛾 *Stenoloba clara* (Leech) (图版XLI-7)

Selepa manleyi var. *clara* Leech, 1889, Proc. zool. Soc. Lond. p. 479. (日本)

Stenoloba clara: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 368, pl. 169, fig. 29. —

Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 273. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het.