

- 前翅亚中褶无黑斑 2
2. 前翅前缘区色暗 蕊夜蛾 *S. cuculoides*
- 前翅前缘区与翅一色 3
3. 翅展 40—52mm 4
- 翅展 34—38mm 褐蕊夜蛾 *S. trajiciens*
4. 前翅中线直 铁蕊夜蛾 *S. ferrigera*
- 前翅中线波曲 5
5. 前翅前缘区近基部一大黑褐斑 玉蕊夜蛾 *S. semialba*
- 前翅前缘区无大黑褐斑 灰蕊夜蛾 *S. grisea*

褐蕊夜蛾 *Stictoptera trajiciens* (Walker) (图版 XLIII-4)

Steiria trajiciens Walker, 1858 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1137. (斯里兰卡)

Stictoptera trajiciens: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 154. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 368. —Chen, 1982, Ico. Het. Sin. 3: 337. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 225.

翅展 24mm。头、胸红褐杂少许黑及灰色；前翅浅红褐带紫色，基浅黑色，内线双线黑色深锯齿形，中线黑色较直而粗，肾纹仅内、外缘黑色，由竖鳞组成，外线双线黑色细锯齿形，外侧一列黑短纹，亚端线微白，前半锯齿形，在亚中褶有一白点，外缘后半有一列白点；后翅半透明白色，翅脉、端区及后缘褐色；腹部浅灰褐色。

分布 云南；印度，斯里兰卡，新加坡，南太平洋若干岛屿。

蕊夜蛾 *Stictoptera cuculoides* Guenée (图版 XLIII-5, 6)

Stictoptera cuculoides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 52. (爪哇?)

Stictoptera cuculoides: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 158. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 369. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 337. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 228.

翅展 37mm。头、胸褐色，翅基片大部乳黄色；前翅乳黄色为主，前缘区一黑褐纵带，后缘区一斜三角形黑褐斑，内线双线褐色波浪形，极细弱，环纹为一黑点，肾纹细黑边，中央二黑点，外线双线黑褐色锯齿形，前段线间灰白，4脉后内斜，亚端线灰白色波浪形，端线为一列衬白的黑点；后翅半透明，端区一黑褐宽带，翅脉黑褐色；腹部灰色带褐。

寄主 红厚壳属、藤黄属。

分布 江西、海南、西藏；日本，马来西亚，新加坡，印度尼西亚，斯里兰卡。