

半透明，翅脉、端区及后缘褐黑色；腹部浅褐黄色。

分布 海南；马来西亚，印度尼西亚，新加坡。

铁蕊夜蛾 *Stictoptera ferrifera* (Walker) (图版 XLIII-10)

Steiria ferrifera Walker, 1864, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 7: 173. (沙撈越)

Steiria ferrifera: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 166. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 371. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 337. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 229.

翅展 44mm。头、胸黑色杂紫棕色；前翅暗棕杂紫灰色，基线、内线及外线均双线黑色，内线仅后半明显，中线黑色波浪形，基线与中线间成一灰白色倒“V”形斑，环纹、肾纹褐色黑边，后者中有黑条，亚端线前半黑色波浪形，后半仅在亚中褶现一黑纹，端区灰色，端线为一列黑点；后翅半透明白色，翅脉、端区及后缘黑棕色；腹部灰棕色。

分布 云南；菲律宾，马来西亚，新加坡。

叶蕊夜蛾属 *Aegilia* Walker

Aegilia Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1138.

Type-species: *Aegilia describens* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，端部稍膨大，额光滑无突起，上部有毛簇，复眼大，雄蛾触角长，线形，基节内缘有大鳞簇；胸部主要被鳞片，翅基片有竖立鳞片丛，前、后胸有鳞簇，下胸被长毛；前翅狭窄，前缘外半稍凹，顶角钝，有一副室；后翅 5 脉发达，自中室下角发出；腹部背面第三节及基节有鳞簇，腹面基部有鳞扇。

叶蕊夜蛾 *Aegilla describens* Walker (图版 XLIII-11, 12)

Aegilla describens Walker, 1858 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1139. (斯里兰卡)

Stictoptera describens: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 149. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 367. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 91.

Aegilla describens: Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 234.

翅展 44mm。头部灰色杂褐色；胸部褐色，翅基片大部黑色；前翅黄白带褐色，部分有浅褐纵纹，中室基部一小黑斑，其外方一长方形黑斑，1 脉近中部一斜方形黑斑，中室端一近三角形黑斑，内端沿中脉内伸成黑线，中室外一斜方形黑斑，顶角一弹头形黑斑，亚端线浅黄色，前半锯齿形明显，后半内侧衬黑褐色，在 1—4 脉间成窄带，端线黑色；后翅白色半透明，前、后缘区、翅脉及端区黑褐色；腹部灰褐色。