

玉蕊夜蛾 *Stictoptera semialba* (Walker) (图版 XLIII-7)

Minica semialba Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 175. (Sarawak)

Minica semialba: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 401. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 164, pl. 178, fig. 4. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 143. —Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 18. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 337. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 231, pl. 4: 20; fig. 167.

翅展 50mm。头、颈板及前胸背面褐色，胸背大部灰色；前翅灰白带极淡霉绿色，前缘基部一黑褐三角形斑，其前一黑褐小斑，内线双线浅褐色波浪形，剑纹为一黑点，环纹为黑色衬灰白窄条，中线黑色微波浪形，肾纹浅褐色，中有暗纹，外线黑色波浪形，外侧衬紫黑褐色，中、外线间带暗褐色，亚端线白色锯齿形，在亚中褶有一黑纵纹，端线为一列黑点；后翅半透明，翅脉黑褐色，端区一黑褐宽带；腹部褐灰色。

分布 海南、云南；印度，马来西亚，新加坡，印度尼西亚。

灰蕊夜蛾 *Stictoptera grisea* Moore (图版 XLIII-8)

Stictoptera grisea Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 67. (大吉岭)

Stictoptera grisea: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 165. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 371. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 230.

翅展 50—52mm。头与颈板红褐色，胸部褐色带灰色；前翅灰色，部分带紫褐色，基线、内线均不明显双线褐色，环纹及肾纹大，褐色黑边，环纹有白环，肾纹有黑竖鳞丛，中线与外线黑色波浪形，外线外侧一列紫褐色粗点，亚端线内侧衬褐色，外侧衬黑褐色，波浪形内斜，亚中褶一黑短纹，近翅外缘一新月形黑纹；后翅白色半透明，翅脉及端区黑褐色；腹部褐灰色。

分布 云南、海南；锡金，印度，马来西亚，新加坡。

丰蕊夜蛾 *Stictoptera repleta* (Walker) (图版 XLIII-9)

Steiria repleta Walker, [1863], 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 173. (Sarawak)

Stictoptera richardi Pagenstecher, 1885, J. B. Nass. Ver. 38: 29.

Stictoptera repleta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 170, pl. 178, fig. 14. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 373, pl. 34g. —Holloway, 1985, Malay. Nat. J. 38: 226, Pl. 3: 24.

翅展 34mm。头、胸浅褐色，颈板与前胸有黑褐斑；前翅黄白色，大部带褐色，基线仅前端现双黑纹，亚中褶基部一斜圆黑斑，内线双线黑色，中室近基部一黑褐纹，剑纹前半黄白色，其外缘有细黑点，环、肾纹黑边，肾纹中央黑色有黄白曲纹及黄白环，中线黑色，外线双线黑色，两侧有黑影，亚端线黄白色两侧衬黑色，锯齿形；后翅白色