

有一副室，后翅 5 脉微弱；腹部基部几节背面有毛簇；腹侧有成列毛簇。

### 丽司冬夜蛾 *Sydiva versicolora* Draudt (图版 XXVI-20)

*Sydiva versicolora* Draudt, 1950, Mitt. Munch. ent. Ges. 40: 71, pl. 5, fig. 9. (云南丽江)

翅展 31mm。头部与颈板褐黄色，下唇须外侧灰黑色；胸部灰黑色；前翅褐色，基线与内线黑色，波浪形，后者外弯，亚中褶基部有一黑纹，环纹与肾纹白色，外线黑色，细锯齿形外弯，亚端线细，不规则锯齿形，外线与亚端线之间褐白色；后翅浅灰褐色，缘毛黄白色；腹部灰褐色。

分布 云南。

## 毛胸夜蛾属 *Dasystemum* Staudinger

*Dasystemum* Staudinger, 1895, Iris 8: 327.

Type-species: *Dasystemum tibetanum* Staudinger.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，前缘饰长毛，第三节稍长，额光滑无突起，雄蛾触角线形，少数双栉形；胸部被长毛，无毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉弱；腹部仅基节背面有毛簇。

### 辽毛胸夜蛾 *Dasystemum tibetanum* Staudinger (图版 XXVI-21)

*Dasystemum tibetanum* Staudinger, 1895, Iris, 8: 327, pl. 6, fig. 9. (青海湖与罗布泊之间)

*Dasystemum tibetanum*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 410, text fig. 138. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 143, pl. 35a.

翅展 40mm。头部与胸部灰色带灰绿褐色，触角黑色，足跗节外侧黑色，各节间有白斑；前翅灰色带绿褐色，布有黑褐细点，基线黑色，仅中室前可见，内线双线黑色，微波浪形，环纹大，近圆形，灰白色，肾纹灰白色，轮廓不清晰，后端稍内突，外线双线黑色，锯齿形外弯，4 脉后内斜，外一线模糊，亚端线不明显，灰白色衬褐色，在 7 脉处外突，中段外弯，端线黑色，间断为点列；缘毛基部有一灰白线；后翅黑褐色，缘毛白色；腹部灰色杂黑褐色。

分布 青海、四川。

## 集冬夜蛾属 *Sympistis* Hübner

*Sympistis* Hübner, [1823] 1816, Verz, bek. Schmett. p. 216.

Type-species: *Noctua melaleuca* Thunberg.

*Sympistoides* Kozhantschikov, 1947, Ent. Rev. 29: 19.