

Sypna mormoides Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 202.

Sypna dubitaria: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 537.

Sypna mormoides: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 364. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 365.

Sypna dubitaria: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 338, fig. 39.

翅展 77 mm。头部及胸部深褐色带紫，并杂以少许白色，翅基片有紫灰斜纹；腹部暗灰褐色；前翅褐色带紫，密布黑色细点，另有少许白色细点，基线黑色达 1 脉，内线双线黑色衬紫灰，波浪形，在亚中褶处折向内斜，环纹淡紫色黑边，肾纹大，紫灰带褐，边缘不清晰，外线双线黑色衬紫灰色，波浪形，4 脉后稍内斜，亚端线双线黑色较粗，外一线色浓，波浪形，在前缘后及 3、4 脉间稍外突，近外缘一列白点，前缘区各线间色深，缘毛基部间以灰色；后翅灰褐色，外线及亚端线黑色波浪形，仅后半明显，线间带有紫色调，近外缘一列白点，端线黑色锯齿形，缘毛灰色；腹部暗灰褐色。

分布 云南、四川、西藏；锡金，印度。

双带闪夜蛾 *Sypna martina* (Felder et Rogenhofer) (图版LVII-9)

Tarvia martina Felder et Rogenhofer, 1874, pl. 114, fig. 6. Reis. Nov. (印度尼西亚)

Sypna tenebrosa Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 203.

Sypna ludifica Swinhoe, 1915, Ann. Mag. nat. Hist. 8, 16: 180.

Sypna nocturna Warren, 1915, Nov. zool. 22: 148.

Sypna leucosticta Prout, 1928, Bull. Hill Mus. 2: 173.

Sypna martina: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 340—341, pl. 15, figs. 11, 13, 16. ——Holloway, 1976, Moths Borneo p. 31, pl. 13: 160.

翅展 58mm。头部与胸部褐色杂黑褐色；前翅褐色，基线隐约可见淡紫灰色，自前缘脉至亚中褶，后端灰白色，内线似一带状，灰白色，在前缘区微弱，在中室及亚中褶处最宽，波浪形，两侧杂黑色，内线内方的前缘脉黑色，环纹小，中央一灰白点，边缘黑色，肾纹大，较窄长，浅褐色，其内缘黑色，外缘白色，外线白色，在前缘区浅灰褐色，2—9 脉间外弯并间断为点列，2 脉后成模糊宽带，内线与外线间在 2 脉后大部带黑色及黑褐色，亚端线黑色，不规则锯齿形，在 3—4 脉间外突明显，5 脉前成三角形黑斑，线内侧有一模糊暗褐窄带，微波浪形，外线外方的前缘脉有一列褐白点，近翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色，缘毛黑褐色；后翅褐色，隐约可见黑褐色外线与亚端线，前者两侧微衬灰色，后者外侧衬灰色，两线在 6 脉前均不显，近翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色，臀角区及外缘区暗褐色；腹部灰褐色。

分布 湖南；印度尼西亚。

本种有多种变异，因而曾被误认为不同种。手头标本亦为一变型，与 Berio 的 *var-*