

iopicta 相似，但前翅外线又有一些变化。

蔗闪夜蛾 *Sypna sobrina* Leech (图版LVII-11)

Sypna sobrina Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 540. (中国: Pu-tsu-fong)

Sypna sobrina form *ornata* Leech, 1900 Trans. ent. Soc. Lond. p. 541.

Sypna sobrina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 366, pl. 67f. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 161. —Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 339, text figs. 43—44. Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1027.

翅展 58 mm。头部与胸部暗褐色，头顶及下唇须外侧黑褐色，足跗节外侧有灰色，各节间有灰白斑；前翅褐色带紫色，基线双线黑色，自前缘脉至 1 脉，内线双线黑色，微波曲内斜，环纹仅现一灰白点，肾纹不明显，中线粗，自前缘脉至中室下角，其后内斜，外线不明显，在中褶处可见一黑纹，3 脉后隐约可见二波曲内斜黑褐细线，亚端线黑色，在 3—4 脉间成一外突齿，近翅外缘有一列灰白点，中线与亚端线间布有少许黑细点；后翅灰褐色，臀角区色暗，外线仅在 2 脉后可见双线黑褐色，亚端线双线黑色，仅在 4 脉后明显，近翅外缘有一列黑点，外侧微白；腹部暗灰褐色。

分布 四川、云南。

析夜蛾属 *Sypnoides* Hampson

Sypnoides Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 5.

Type-species: *Sypna mandarina* Leech.

Supersypnoides Berio, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria. 70: 344.

Equatosypna Berio, 1960, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 71: 304.

喙发达，下唇须向上伸，额有毛簇，雄蛾触角多为线形，有纤毛丛，后足胫节具刺；前翅有副室。雄蛾钩形突基部两侧各一支突。

种 检 索 表

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. 前翅基部、亚顶区及臀角各有一暗色斑 | 旗析夜蛾 <i>Sypnoides mandarina</i> |
| 前翅基部、亚顶区及臀角无暗色斑 | 2 |
| 2. 前翅内、中线白色 | 3 |
| 前翅内、中线非白色 | 11 |
| 3. 钩形突基部分二支，较短 | 4 |
| 钩形突基部分二支长 | 10 |
| 4. 分支端部弯曲 | 5 |
| 分支端部不弯曲 | 6 |