

Sypnoides fumosa: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 348, figs. 60—66. ——Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 866.

翅展 40—50 mm。头部与胸部暗褐色，腹眼下方有一黑褐三角形斑，下胸褐灰色，足跗节外侧黑褐色，各节间有褐灰色斑；前翅暗褐色，内线双线白色，自前缘脉外弯至翅后缘，外一线在中室前缘及亚中褶各成一钝齿，环纹只现一白点，肾纹窄长，内外缘中凹，白边，后端稍内突，中央浅褐黄色，外线在前缘区及中脉后为白色双线，9脉后黑褐色单线，在7—8脉处明显外突，4—5脉间稍外突，内一线在亚中褶处内突成齿，亚端线黑色，自前缘近顶角锯齿形内斜，4—6脉间内曲弧形，其后不规则波曲内斜，线内方的前缘脉上有一列白点，近翅外缘有一列白点，内侧衬黑褐色；后翅褐色，外线隐约可见，暗褐色，前半外弯，亚端线浅褐黄色，细波浪形，6脉前不显，内侧暗褐色，3脉后两侧杂有黑色，近翅外缘有一列白色短纹，内侧均衬黑色弧形纹；腹部暗褐色，背面各节间灰色，毛簇端部黑褐色。

分布 湖南；日本。

晕线析夜蛾 *Sypnoides reticulata* Berio (图版 LVIII-7)

Sypnoides reticulata Berio, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 354, pl. 17, fig. 26, text fig. 78 male genitalia. (康定)

翅展 50 mm。头部黑褐色，触角基节外侧灰白色，下唇须外侧杂灰白色；胸部褐色杂黑褐色及灰白色，颈板端部褐灰色，翅基片近端部有黑横纹；前翅褐色，大部带有黑棕色，基线双线白色，外弯，自前缘脉至1脉，内线双线白色，外弯，外一线在中室前缘及亚中褶处成外突齿，环纹只现一白点，肾纹窄长，内外侧中凹，白边，中有一黄纹，外线在前缘区及中脉后为白色双线，内一线在亚中褶成一内凸齿，外一线粗，3—6脉间不明显，6—9脉间单线微白，外线内方的各翅脉有细白线，亚端线粗，黑色，自顶角微波曲内弯，4脉处外突，此后锯齿形内斜，前半外方浅褐色，线内侧有一模糊暗褐带，前缘脉有一列白点，近翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色，翅前半缘毛浅褐间暗褐色，后半缘毛黑褐色；后翅灰褐色，外半色暗，可见褐灰色外线及亚端线，两侧均暗褐色，近翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色，5脉前缘毛褐黄色，其余黑褐色；腹部暗褐色，基节背毛簇灰褐色。

分布 四川。

细线析夜蛾 *Sypnoides erebina* (Hampson) (图版 LVIII-8)

Sypna erebina Hampson, 1926, Desc. new Gen. Spec. Noct. Br. Mus. p. 5. (康定)

Sypnoides erebina: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 347, pl. 16, fig. 22, text fig. 59.

翅展 56 mm。头部与胸部褐色杂暗褐色及灰色；前翅褐色，布有黑褐细点，基线双线灰白色，二曲形，自前缘脉至 1 脉，内线双线灰白色，外弯，在前缘区为细波浪形，在中室前缘及亚中褶折角，环纹仅现一白点，肾纹窄长，白边，中部白色，外线双线白色，波浪形，3—9 脉间黑褐色，不清晰，外弯，亚端线黑色，前半微波浪形内弯，在 4 脉处外突呈锯齿状，3 脉后波浪形，线内侧有一黑褐色宽带，近翅外缘有一列黑点，其外侧衬白色，缘毛深波浪形；后翅褐色，隐约可见暗褐色外线，亚端线双线黑褐色，向前渐融合并微弱，6 脉前不显，翅外缘有一列黑点，外侧均衬白色，缘毛深波浪形，中有一浅褐线；腹部褐色，背面杂有黑褐色。

分布 黑龙江、四川；朝鲜，日本。

浅褐析夜蛾 *Sypnoides lilacina* (Leech) (图版 LVIII-9)

Sypna rectilinea var. *lilacina* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 539. (中国)

Sypna simplex ab. *lilacina*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 365.

Sypnoides lilacina: Berio & Fletcher, 1985, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 358, fig. 89.

翅展 41 mm。头部与胸部浅褐色杂少许暗褐色，下唇须外侧上半部暗褐色杂灰色，头顶杂黑褐色；前翅浅褐色，基线不明显，灰白色，内侧衬黑褐色，自前缘脉至 1 脉，内线双线白色，微外弯，线间暗褐色，环纹只现一白点，肾纹窄长，中凹，内外缘白色，中央有一浅黄横纹，外线在前缘区及中脉后为白色双线，其余仅隐约可辨，外弯于肾纹外方，内线与外线之间在中室后半至翅后缘带有淡紫白色，亚端线不清晰，黑褐色，间断，自前缘脉近顶角处内斜至 6 脉后内弯，4 脉后波曲内斜，前段粗，翅外缘有一列黑点，外侧均衬白色，顶角较尖，外缘波浪形；后翅浅褐色，外线隐约可见，微黑，中褶前不显，亚端线在 3 脉后呈双线，微黑，稍波曲；腹部褐色，背毛簇浅褐黄色。

分布 四川；缅甸。

单析夜蛾 *Sypnoides simplex* (Leech) (图版 LVIII-10)

Sypna simplex Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 539. (峨眉山)

Sypna simplex: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 365, pl. 67d. —Draudt. 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 161. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 365.

Sypnoides simplex: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 358, fig. 90 male genitalis; fig. 20 adult.

翅展 45 mm。头部与胸部棕褐色，前足胫节外侧褐黑色，跗节各节间有白斑，中足与后足胫节与跗节褐灰色，有黑褐纹；前翅棕褐色，基线白色，微外弯，自前缘脉至 1 脉，内线双线白色，自前缘脉直线后行至 1 脉折向内斜，环纹只现一白点，肾纹窄长，褐色白边，中央有一黄斑纹，外线双线白色，内一线弱，在前缘区稍内斜，其后外