

Sypna prunnosa: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 538. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 364.

Sypnoides prunnosa: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 351, figs. 73—74.

翅展 54 mm。头部与胸部紫棕色；前翅黑棕色带紫色，内线双线黑色，在中室前缘微折曲，外一线弱，不完整，环纹近圆形，浅褐色，肾纹较窄，前端尖，稍外伸，褐色黑边，中有褐圈，外线双线黑色，自前缘脉至中室间成一褐条，其后外弯，在中褶处内凹，3脉后内伸至肾纹后端，折角微波浪形内斜，内一线弱，内线与外线之间在中室后呈褐色，似一宽带，连同内线前半外侧及肾纹前的褐条合成一树杈状，亚端线黑色，不规则锯齿形，在7、8脉处外凸，中褶处强内凹，4脉处成一大外凸齿，近翅外缘有一列黑点，均衬以白色；后翅棕褐色，隐约可见棕色外线及亚端线，后者双线，内一线粗，前半模糊，线间浅褐色，翅外缘有一列黑点，均衬以白色；缘毛锯齿形；腹部背面深棕色。

分布 福建、四川、云南；锡金，印度。

层析夜蛾 *Sypnoides missionaria* Berio (图版 LVIII-15)

Sypnoides missionaria Berio, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria, 70: 354, pl. 17, fig. 27, text fig. 79 male genitalia. (康定)

翅展 55 mm。头部与胸部褐色杂黑褐色及褐灰色，下唇须外侧黑褐色杂少许褐灰色，下胸浅褐色；前翅暗褐色，布有黑色细点，基线细，白色，自前缘脉至1脉，稍外弯，内线双线白色，自前缘脉外弯，在中室前缘及亚中褶折角，外一线细，环纹仅现一白点，肾纹大，窄长，内外缘中凹，后内端沿中脉稍内突，白边，中有一浅黄纹，外线在前缘区及肾纹后为白色双线，3—9脉间不明显，隐约可见白色及浅褐色，在中褶处内凸，外线外方前缘脉有一列白点，亚端线黑色，自前缘脉微曲内弯，在4脉处外突，其后锯齿形内斜，前半外方色浅，近翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色，内、外线间的各翅脉色浅，缘毛锯齿形，基半部黑褐色，齿尖杂淡褐色；后翅褐色带黑褐色，外线微黑，外弯，亚端线粗，黑褐色，近翅外缘有一列黑细纹，外侧微白，4脉前的缘毛黄褐色，其余黑褐色；腹部背面黑褐色，各节间有细褐黄横线。

分布 湖北、四川。

朋闪夜蛾属 *Hypersypnoides* Berio

Hypersypnoides Berio, 1954, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 66: 341.

Type-species: *Hypersypnoides congoensis* Berio.

Hyposypnoides Berio, 1954, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 66: 343.