



图 199—200 雄性外生殖器. 199. 准圣盘尺蛾 *Syzeuxis extritonaria* Xue;
200. 新圣盘尺蛾 *S. neotritonaria* Xue

雄性外生殖器 (图 199): 钩形突短宽, 上端中部凹陷较深。背兜腹面大突粗大, 端部尖。抱器瓣长, 背基部略展宽, 中部叠覆于其上, 末端尖。阳茎细小, 端膜无刺。

检视标本: 3 ♂ (正模和副模), 云南腾冲大蒿坪, 2 020 m, 1992. V. 24—26。

分布: 云南。

新圣盘尺蛾 *Syzeuxis neotritonaria* Xue (图版 IV: 5)

Syzeuxis neotritonaria Xue, Acta Zootaxonomica Sinica. (in press) (西藏: 错那麻麻)

前翅长: ♂ 15 mm。特征极近似前种 (准圣盘尺蛾 *Syzeuxis extritonaria* Xue) 和本属模式种 [*Syzeuxis trinotaria* (Moore)]。下唇须极长, 约 2/3 以上伸出额外。翅面颜色特别浅淡, 无黄绿色调; 中线和外线细弱, 不完整, 在前缘处几乎不形成明显的黑斑, 两线间距离较宽。前后翅反面外线细弱, 深灰褐色。前翅翅型近似前种, 但外缘中部略有凸出。翅脉与前种相同。

雄性外生殖器 (图 200): 近似前种。抱器瓣形状不同。抱器背基半部极度展宽隆起, 抱器瓣端半部叠覆于抱器背之上的部分较小, 背缘弧形, 末端尖角下垂。阳茎较准圣盘尺蛾更为细小。

检视标本: 1 ♂ (正模), 西藏错那麻麻, 2 900 m, 1974. VIII. 6。

分布: 西藏。