

3—4 脉间稍外弯，亚端线只现一列黑点，外线与亚端线间的亚中褶有模糊黑斑，近翅外缘有一列黑点，端线黑褐色，缘毛褐色；腹部灰褐色。

分布 四川峨眉山、湖南。

东方坦夜蛾 *Tamba corealis* (Leech) (图版 LXV-32)

Hypena corealis Leech, 1889, Entom. 22: 62, pl. 2, fig. 1. (朝鲜)

Tamba corealis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 410, pl. 74e. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 180, pl. 115, fig. 2428. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 874. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 148, pl. 15, fig. 292.

翅展 30mm 左右。头部及胸部淡灰褐色，杂有黑色及少许红棕色，下胸白色；前翅黄褐色，布有零星黑点，基线黑色达后缘，在中室处稍折曲，内方杂黑褐色，环纹为一黑点，内线淡褐色，自前缘脉外斜至肾纹内侧，折角内斜，肾纹淡褐灰色，中凹，边缘微黑，外侧有一暗褐曲纹，外线白色，内侧衬黑灰色，外侧衬褐色，外弯于 7 脉与 5 脉处，在 4 脉后微曲内斜，在中褶处内弯，白色较显，亚端线黑色锯齿形，稍间断，外侧在中褶处衬红褐色，外线与亚端线间的前缘脉上有三个黄色点，翅外缘中部突成角，近外缘有一列黑点；后翅色似前翅，外线白色，亚端线黑色模糊，后端内侧有一不规则形小黑斑，近外缘有一列黑点；腹部暗褐灰色。

分布 江西；日本，朝鲜。

羽胫夜蛾属 *Olulis* Walker

Olulis Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br Mus. 27: 126.

Type-species: *Olulis puncticinctalis* Walker.

Hamaxia Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 128.

Phachthia Walker, 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 30: 979.

喙发达，下唇须细，向上伸，第二节达头顶，第三节长，触角线形；胸部与腹部无毛簇，雄蛾中足胫节基部有一大毛簇；前翅窄长，外缘中部折曲，前半稍凹，8、9、10 脉共柄；后翅 3、4 脉共柄，5 脉发达，近中室下角发出。

顶斑羽胫夜蛾 *Olulis shigakii* Sugi (图版 LXV-33)

Olulis shigakii Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 874, pl. 217, figs. 33—34; pl. 378, fig. 4. (日本)

翅展 28 mm。头部与胸部灰白色，下唇须第二节外侧浅褐色并布有黑褐点，第三节端部黑褐色，胸背毛簇端部锈褐色，足胫节布有黑棕细点，胫节与跗节带有褐色；前