

## 种 检 索 表

1. 前翅内区有棕色宽带 ..... 暗斑坦夜蛾 *Tamba gensanalis*  
 前翅内区无棕色宽带 ..... 2
2. 肾纹外有白斑 ..... 白斑坦夜蛾 *T. cinnamomea*  
 肾纹外无白斑 ..... 东方坦夜蛾 *T. corealis*

暗斑坦夜蛾 *Tamba gensanalis* (Leech) (图版 LXV-30)

*Capnodes gensanalis* Leech, 1889, Entom. 22: 63, pl. 2, fig. 9. (朝鲜)

*Tamba gensanalis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 410, pl. 74e. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 180, pl. 115, fig. 2427. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 874.

翅展 42 mm。头部与胸部红褐色杂暗灰色及黑褐色，足胫节外侧黄白色带红棕色，跗节外侧黑色，各节间有黄白斑；前翅褐灰色，内区有一棕色宽带，其内缘在中室前缘折曲，外缘波浪形外弯，环纹只现一黑点，中线极细弱，褐色，波浪形，肾纹不显，其外侧一黑线，外线淡褐灰色，两侧微衬红棕色，自前缘脉波曲外斜至 4 脉后内斜，内侧 3—7 脉间带红棕色，似一斑块，其中的翅脉淡褐灰色，外线外侧在 8 脉前有一黑褐色近三角形斑，其外方的前缘脉黑褐色，有一列黄白纹，亚端线不明显，同翅色，外侧有一列红棕色锯齿形斑，近翅外缘有一列黑褐点，翅外缘中部外突成钝角，顶角稍外突而尖；后翅浅褐色，布有黑褐细点，外线淡黄色，外侧衬黑褐色，有间断，5 脉前不显，4 脉后内斜，亚端线隐约可见，近翅外缘有一列黑点；腹部灰褐色，基节背面红棕色。

分布 福建；日本，朝鲜。

白斑坦夜蛾 *Tamba cinnamomea* (Leech) (图版 LXV-31)

*Zethes cinnamomea* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 606. (峨眉山)

*Tamba cinnamomea*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 410, pl. 74e. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1033.

翅展 30 mm。头部与胸部淡褐黄色杂红褐色及黑色；前翅褐色微带紫红，内线内方杂有黑色及灰色，内线黑棕色，外弯，后半外侧衬红褐色，环纹只现一黑点，中线模糊，微黑，自前缘脉波曲外斜至中室前缘，在中室不显，在肾纹后内斜，内外线之间布有零星细黑点，肾纹窄曲，褐灰色，白边，中有一黑褐曲纹，外线白色，自前缘脉外斜，在 8—9 脉间呈细锯齿形，在中褶处内凸，至 4 脉后内斜，前半内侧衬黑色，外侧在中褶处有一白斑，亚端线隐约可见，黑色，不规则波浪形，在中褶处内弯，前端内方的前缘脉上有一列淡黄点，近翅外缘有一列黑点，翅外缘中部外突成一钝角，缘毛褐色；后翅色似前翅，中线粗而模糊，微黑，横脉纹黑色，断为二长点，外线黄白色，在