

Type-species: *Noctua cespitis* Denis et Schiffermuller.

Neuronia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 215.

Charaeas Stephen, 1829, Ill. Brit. Ent. p. 108.

Neuronia Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Ind. Univ. p. 249.

Epineuronia Rebel, 1901, Cat. Lep. Pal. p. 155.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘饰较长毛，第三节向前伸，额平滑无突起，眼大，圆形，胸部主要被鳞，前、后胸有散开型毛簇，腹部基节背面有毛簇，前翅有副室。

种 检 索 表

- 雄蛾触角双栉形 芸浊夜蛾 *Tholera decimalis*
 雄蛾触角锯齿形 浊夜蛾 *T. cespitis*

芸浊夜蛾 *Tholera decimalis* (Poda) (图版 XIX - 14)

Phalaena Geometra decimalis Poda, 1761, Ins. Mus. Graec. p. 92. (希腊)

Bombyx popularis Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 577.

Tholera popularis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 216. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 301.




图 358 芸浊夜蛾 *Tholera decimalis* (Poda) ♂ 外生殖器

翅展 35mm。头、胸褐色杂白色；前翅褐灰色，布有黑棕细点，翅脉纹白色，基线、内线、外线均双线黑色，剑纹大，中有一白纹，环、肾纹浅褐色，后者后端内突，亚端线浅黄色，间断为点列，线内侧一列黑齿纹，外侧一列黑纹；后翅黄白色；腹部灰黄色。雄蛾抱器瓣腹端近端部凹（图 358）。

寄主 早熟禾。

分布 新疆；土耳其，欧洲。

浊夜蛾 *Tholera cespitis* (Denis et Schiffermüller) (图版 XIX-15)

Noctua cespitis [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 82. (奥地利)

Tholera cespitis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 218. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 88.

翅展 39mm。头、胸黑褐杂少许红褐色；前翅褐色，基线、内线、外线黑色，基、外线外侧衬黄褐色，内线内侧衬黄褐色，剑纹小，黑边，环、肾纹褐黄色，肾纹后端稍内突，外线锯齿形，齿尖为点状，亚端线黄白色锯齿形，内侧一系列黑齿纹；后翅黄白色；腹部灰褐色。

寄主 银须草属等。有食根性。

分布 新疆；欧洲。

羚夜蛾属 *Thargelia* Püngeler

Thargelia Püngeler, (1900) 1899, Iris, 12: 104.

Type-species: *Scotochrosta distincta* Christoph.

喙不发达，下唇须斜向前伸，下缘饰毛，额有圆突，其下有三角形角质片，复眼大，圆形，有纤毛，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛丛；胸部主要被鳞片，前、后胸有散开形毛簇，前足胫节端部有一小爪；腹部基节背面有毛簇。

羚夜蛾 *Thargelia distincta* (Christoph) (图版 XIX-16)

Scotochrosta? distincta Christoph, 1884, Mem. Lep. 1: 124, pl. 8, fig. 3. (Achal-Tekke)

Odontelia megastigma Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 80.

Thargelia distincta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 220. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 80.

体长 20mm；翅展 46mm。头部与胸部灰白色杂褐色及黑色，下唇须第二、第三节外侧灰黑色，颈板中部有一黑横线；前翅灰白色，布有褐色细点，基线仅在前缘脉可见双黑纹，中室基部后方有一波曲黑纵纹伸达剑纹，剑纹较大而长，黑边，环纹长椭圆形，黑边，肾纹后部膨大，内端稍内凸，外端外凸为二齿，外线不明显，不规则深锯齿形，有间断，亚端线灰白色，不规则锯齿形内斜，有间断，外侧有一列齿形黑纹，端线由一系列新月形黑点组成，缘毛褐白相间；后翅白色，翅脉浅褐色，端区布有褐色细点，端线褐色；腹部褐灰色，毛簇灰黑色。

分布 新疆；中亚地区。