

Phyllodes fasciata Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 69.

Phyllodes eyndhovii: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 389. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 470, —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 102. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 352.

翅展 100 mm。头、胸及前翅棕褐色带灰色，前翅环纹只现一黑点，肾纹斜曲，褐色有棕环，内线与中线只现波曲褐影，外线隐约可见，亚端区有一暗褐影，一黑棕纹自顶角至肾纹后，其前侧衬灰色，顶角尖似钩，翅外缘后半弧形；后翅棕褐带灰色，中带黄色，其中部折曲，两侧黑色，外缘后半波浪形；腹部灰褐色。

分布 福建、广东、四川；锡金，印度，印度尼西亚。

肖毛翅夜蛾属 *Thyas* Hübner

Thyas Hübner, 1824, Saaml. exot. Schmett. 2: pl. 203.

Type-species: *Thyas honesta* Hubner.

Lagoptera Guenée, 1852, Hist. Nat. Ins. p: 223.

Dermaleipa Saalmuller, 1891, Lep. Madag. p. 460.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节短或一般长短，额平滑，复眼圆大；胸部几乎全被毛，无毛簇；雄蛾前后足胫节饰长毛，前足胫节无刺，中足胫节具刺，后足胫节在中距与端距之间有刺；腹背基部几节有毛簇；前翅前缘在尖端拱起，顶角稍外伸而尖锐，外缘曲度平稳，略呈锯齿形；后翅中室约为翅长的 1/3，雄蛾的后翅反面有丝状香鳞。

种 检 索 表

- 后翅内 2/3 黑色，有一蓝白色钩形纹 庸肖毛翅夜蛾 *Thyas juno*
 后翅红色，亚端区有一黑斑 肖毛翅夜蛾 *T. honesta*

庸肖毛翅夜蛾 *Thyas juno* (Dalman) (图版LII-6)

Noctua juno Dalman, 1823, Anal. Entom. p. 52. (未注明模式产地)

Ophideres elegana Hoeven, 1840, Tijd. nat. Gesch. 7: 280.

Lagoptera multicolor Guenée, 1852, Hist. nat. Ins. 3: 226.

Thyas bella Bremer et Grey, 1852, Et. Ent. p. 66.

Lagoptera juno: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 852.

Dermaleipa juno: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 406. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 471.

翅展 85 mm。头、胸及前翅赭褐色或灰褐色，前翅布有细黑点，后缘红棕色，基线、内线及外线红棕色，内线后半及外线直内斜，环纹为一黑点，肾纹灰褐色，中有黑点，一黑色或赭黄色曲线自顶角至臀角，亚端区有一隐约的暗褐纹，翅外缘一列黑点；后翅黑色，端区红色，中部有粉蓝色钩形纹，外缘中段有密集黑点；腹部红色，背面大部暗灰棕色。

寄主 桦、李、木槿。成虫吸食多种果汁。

分布 黑龙江、辽宁、河北、山东、河南、安徽、浙江、湖北、湖南、福建、江西、海南、四川、贵州、云南；日本，印度。

肖毛翅夜蛾 *Thyas honesta* Hübner (图版LIII-1)

Thyas honesta Hübner, 1824, Saaml. exot. Schmett. 2: pl. 203. (未注明模式产地)

Ophiusa honesta: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 504.

Lagoptera honesta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 414. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 471, pl. 56b. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 353.

Thyas honesta: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 158. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 852.

翅展 81 mm。头部褐色，下唇第一、二节大部绯红，第三节黑色；胸部背面褐色，下胸与足绯红色，前足胫节与跗节外侧灰黑色；前翅褐色，杂有赤褐色并密有少许黑色细点，内线暗褐色，波曲外斜，环纹只现一白点，肾纹灰白色，两侧中凹，后半中央有黑点纹，外线暗褐色，锯齿形，前半稍外弯，在各翅脉上成细白点，亚端线暗褐色，内侧衬灰白色，自顶角内斜至 6 脉，其后赤褐色，内弯；后翅绯红，亚端区有一约呈三角形的黑斑，前钝后尖，自 6 脉至 3 脉，翅外缘及缘毛除臀角外均赤褐色，外缘在 2、3 脉处有少许白细点；腹部绯红色。

分布 广西、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，新加坡，菲律宾等。

关夜蛾属 *Artena* Walker

Artena Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1388.

Type-species: *Artena submira* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额中部，第三节短；额平滑，复眼圆大；胸部仅被毛而无毛簇，胫节饰长毛，均具刺；腹背扁平，有细长毛；前翅狭长，有副室，顶角较圆，外缘曲度平稳，成锯齿形；后翅中室约为翅长的 1/3。

种 检 索 表

前翅内外线后端相遇 锈色关夜蛾 *Artena rubida*