

喙发达，下唇须向前平伸，下缘饰毛，额有圆突，下有一角质片，雄蛾触角线形，头部与胸部毛、鳞混杂，前足胫节短宽，内侧有长而弯的爪，外侧有一短爪，中、后足胫节具刺；前翅稍窄，顶角稍尖，有一窄长副室；后翅5脉细弱。

种 检 索 表

前翅有2银白纵纹 双纹短胫夜蛾 *Timora bivittata*
 前翅无银白纹，后缘区桃红色 泰短胫夜蛾 *T. taishana*

双纹短胫夜蛾 *Timora bivittata* (Walker) (图版VII-19)

Leucania bivittata Walker, 1856, List Spec. Ins. Colln. Br. Mus. p. 108. (East Indies)

Timora bivittata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 177. —Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 113, pl. 58, fig. 10. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 314, pl. 28d.

翅展27 mm。头部与胸部褐色，触角干白色；前翅红褐色，前缘白色，亚中褶有一银白色纵纹，自基部伸达翅外缘，其前缘内半微拱曲，纵纹向外渐窄，端部有一黑色齿形纹，纵纹前、后缘均衬黑色，另一银白色纵纹自中室中部外伸至翅外缘，向外渐窄，基部细尖，纵纹前、后缘亦衬黑色，翅端区另有一列银白色纵纹，位于2、3、4、6脉处，各纹前、后缘衬以黑色；后翅纯白。前、后翅反面白色，前、后翅的前缘区及前翅中脉带有红褐色；腹部白色带褐色。

分布 山东；印度，缅甸。

泰短胫夜蛾，新种 *Timora taishana* Chen sp. nov. (图版VII-20)

翅展23 mm。头部与胸部浅黄色杂桃红色，额浅褐色，足外侧桃红色；前翅淡稻




图77 泰短胫夜蛾，新种 *Timora taishana* sp. nov. ♂外生殖器