

亭夜蛾 *Tinolius eburneigutta* Walker (图版 LXIII-11)

Tinolius eburneigutta Walker, 1855, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 3: 621. (斯里兰卡, 印度, 孟加拉国)

Tinolius eburneigutta: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 185, pl. 171, fig. 10. ——Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 578, fig. 324.

翅展 50 mm。头部绯红, 雄蛾触角双栉形, 栉齿长, 端部有一鬃, 头顶带有黄白色; 颈板绯红色, 中部带黄白色, 内、外缘基部各一小黑斑, 中央有一圆形黑斑, 胸部绯红色, 翅基片带黄白色, 前足胫节外侧带黄白色, 基部、中部及端部各有一近圆形黑斑, 跗节黑色, 基节基部及端部黄白色, 中、后足胫节外侧近基部与近端部各有一水滴形黑斑, 胫距大部黑色, 跗节黑褐色, 有黄白斑; 前翅褐色, 1 脉基部有一小白斑, 环纹大, 白色, 扁圆形, 肾纹为二扁圆白斑, 位于中室横脉两端, 后一斑较大, 翅后缘中段有二白斑; 后翅绯红, 缘毛浅黄色; 腹部绯红, 背面各节有黑色横条, 腹面各节中部有一方形或长方形黑斑。

分布 云南; 印度, 孟加拉国, 斯里兰卡。

四星亭夜蛾 *Tinolius quadrimaculatus* Walker (图版 LXIII-12)

Tinolius quadrimaculatus Walker, [1865] 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 31: 281. (柬埔寨)

Tinolius zingha Swinhoe, 1890, Trans. ent. Soc. p. 185.

Tinolius quadrimaculata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 579.

翅展 49 mm。头部绯红, 头顶杂有暗褐色, 雄蛾触角双栉形, 栉齿长, 触角干背缘灰白色; 颈板绯红, 中部带淡黄色, 内、外缘基部各有一小黑斑, 中央有一圆形黑斑; 胸部绯红, 翅基片大部褐色, 足胫节外侧基部、中部及端部各有一黑斑, 跗节黑色, 有灰白斑; 前翅褐色, 亚中褶基部有一白点, 环纹大, 白色, 扁圆形, 肾纹为二白斑, 位于中室横脉两端, 后一斑大, 翅后缘中段有二白斑; 后翅中室及其后方绯红色并扩展至臀角区, 其余褐色; 腹部绯红, 各节侧面有细黑纹。

分布 云南; 锡金, 缅甸, 柬埔寨。

钝夜蛾属 *Acantholipes* Lederer

Acantholipes Lederer, 1857, Noctuiden Eur.: 44, 198.

Type-species: *Noctua regularis* Hübner.

Docela Walker, 1866, List. Spec. Ins. Colln Br. Mus. 34: 1258.

Lasionota Warren, 1912, Nov. zool. 19: 55.