

Type-species: *Agrotis plagiata* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第三节短，斜伸，额无突起，眼大，圆形，雄蛾触角线形；前胸有三角形脊状毛簇，后胸有散开型毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅顶角稍尖；后翅中室短，3、4脉共柄，5脉弱，自中室横脉中部伸出。

### 掌夜蛾 *Tiracola plagiata* (Walker) (图版XIX-24)

*Agrotis plagiata* Walker, 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 740. (斯里兰卡)

*Tiracola plagiata*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 258. —Holloway, 1979, Surv. Lep. Biol. ecol. New Caledonia. p. 407. —Barlow, 1982, Moths S. E. Asia. p. 85. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303.

翅展 51—55 mm。头、胸、前翅褐黄色，前翅有细褐点及零星黑点，端区带暗灰和赤褐色，基线点列状，内线黑棕色波浪形，环纹褐边，肾纹，红棕色，稍扩展至翅前缘，中线褐色，外线两端黑棕色，其余为黑点，亚端线黄色，内侧衬赤褐色；后翅与腹部暗褐色。雄蛾抱钩极长，棒状，端部具刺（图 362）。




图 362 掌夜蛾 *Tiracola plagiata* (Walker) ♂ 外生殖器

**寄主** 柑橘类、茶、萝卜、水茄等。

**分布** 山东、浙江、湖南、台湾、福建、海南、四川、云南、西藏；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲，美洲。

### 尼夜蛾属 *Niaboma* Nye

*Niaboma* Nye, 1975, Gen. (Names) Moth. World vol.1: 336.

Type-species: *Manobia xena* Staudinger.