

一小突似钩，近翅外缘有少许黑点，缘毛前半部有少许黑点，顶角处缘毛黑棕色；后翅白色，缘毛基部有一列黑点；腹部白色，第二节背面毛簇黄色。雌蛾前翅中区的银白斑边缘有黑色鳞。

分布 江西；马来西亚。

斑表夜蛾 *Titulcia confictella* Walker (图版 XXXVIII-16)

Titulcia confictella Walker, 1864, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 29: 811. (Sarawak)

Chionomera queusta Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. 12: 259.

Titulcia confictella: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 484, pl. 186, fig. 27. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 420. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 21 mm。头部黄色；胸部背面银白色，下胸与足白色，前胸胫节及跗节黄色带褐色；前翅黄色带赤褐色，基部有一近三角形银白斑，自亚前缘脉至翅后缘，内外侧均衬以红棕色，中区有一银白斑，约呈斜方形，自前缘脉后至翅后缘，边缘微波浪形，其外缘在 5 脉处外凸近达翅外缘，其后内斜，斑的内、外缘及前缘均衬以红棕色，亚端区有一银白色小斑，自前缘脉后至 6 脉，其外缘波曲，四周围以红棕色波形形边；后翅白色；腹部白色，第二节背毛簇橘黄色。

分布 江西；新加坡，马来西亚。

爱丽夜蛾属 *Ariolica* Walker

Ariolica Walker, 1863 1864, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 53.

Type-species: *Ariolica lineolata* Walker.

Chionomera Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 18.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部毛鳞混生，无毛簇；腹部基部两节有小毛簇；前翅顶角圆形，外缘斜曲，不成锯齿形，8、9、10 脉共柄，无副室。

中爱丽夜蛾 *Ariolica chinensis* Swinhoe (图版 XXXVIII-17)

Ariolica chinensis Swinhoe, 1902, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 10: 49. (四川峨眉山)

Chionomera chinensis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 295.

Ariolica chinensis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 488, pl. 186, fig. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 991.

Ariolica (Pulchella) chinensis: Mell, 1943, Zool. Jb. (Syst.) 76: 214.