

线、内线黑色衬红褐色，环纹及肾纹大，褐色，两纹后端接近，外线黑色锯齿形，外侧衬红褐色，亚端线双线黑褐色，在3—5脉处为锯齿形，此段外侧有黑齿纹；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 云南、西藏。

耻冬夜蛾 *Trichoridia herchatra* (Swinhoe) (图版 XXVI-15)

Crymodes herchatra Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. 6 (12): 260. (锡金)

Dimya herchatra: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 142.

Trichoridia herchatra: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 406. —Nye, 1975, Lepid. Cat. Noct. 1—2: 490. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.220.

翅展 32—36mm。头、胸黑色杂白色；前翅黑褐色，翅脉灰色有白点，中区色暗，基线、内线、中线及外线黑色，内线波浪形，内侧灰白色，外线锯齿形，外侧灰白色，剑纹、环纹与肾纹均小，环纹灰色，肾纹黑色，亚端线黄褐色，在3—4脉处呈锯齿形，线内侧一列黑纹，外侧衬黑色；后翅褐黄，翅脉与端区褐色，可见波曲外线；腹部灰色杂褐。

分布 西藏；锡金，印度。

月耻冬夜蛾 *Trichoridia albiluna* Hampson (图版 XXVI-16)

Trichoridia albiluna Hampson, 1906, CatLep. Phal. Br. Mus. 6: 404, pl. 105, fig. 24. (西藏亚东)

Trichoridia albiluna: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.220.

翅展 35mm。头、胸及前翅灰褐色，前翅杂有黑色并布蓝白细点，基线、中线及外线黑色，中线波浪形，外线锯齿形，内线双线黑色，波曲外斜，剑纹、环纹及肾纹均黑边，后者外侧有黄白纹，亚端线灰白色波曲形，两侧衬黑色，内侧多为斑纹状；后翅灰褐色，外线黑色，亚端线褐色；腹部灰色带褐。

分布 西藏。

黑耻冬夜蛾 *Trichoridia leuconephra* Draudt (图版 XXVI-17)

Trichoridia leuconephra Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 78, pl. 5, fig. 17. (云南丽江)

翅展 40mm。头部与胸部黑色有蓝色感，杂有少许灰色；前翅黑色，密布灰色细点，基线灰白色，波浪形，自前缘脉至1脉，内线白色，两侧衬浓黑色，大锯齿形外斜，剑纹黑色，外围微白，环纹灰色，中央微黑，黑边，近圆形，肾纹白色，中有一黑曲纹，中线模糊，浓黑，外斜至中室下角折向内斜，外线白色，两侧衬浓黑色，深锯齿形，外弯，4脉后内斜，亚端线白色，有间断，在7脉前及中褶外内凹，线内侧有一列