

新月形黑纹，外侧一列黑纹，翅外缘有一列半圆形黑纹，缘毛端半部微白；后翅褐灰色，端区黑褐色，外线黑色，自中褶至翅后缘，亚端在黑褐端区中现灰白色；腹部灰褐色。

分布 云南。

黄耻冬夜蛾 *Trichoridia flavicans* Draudt (图版 XXVI-18)

Trichoridia flavicans Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 78, pl. 5, fig. 19. (云南丽江)

翅展 30mm。头部与胸部褐色，翅基片浅黄色，中央微白；前翅浅黄色，部分带暗褐色，基线褐色，细弱，波浪形，自前缘脉至 1 脉，内线不显，剑纹仅见外缘褐边线，环纹白色，窄斜，后端尖，与肾纹相连，中央有一棘形褐纹，肾纹白色，窄长方形，中有一褐曲纹，外线不清晰，白色，仅前缘区及 2 脉后明显，亚端线白色，不规则锯齿形，内侧在 5 脉至 1 脉间有几个黑斑，前段向外扩展至顶角成一大斜斑状，端线黑色，波浪形；后翅暗黄褐色，端区带有黑色；腹部黑灰色带褐色，臀毛簇红褐色。

分布 云南。

光耻冬夜蛾 *Trichoridia cuprescens* Hampson (图版 XXVI-19)

Trichoridia cuprescens Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 405, pl. 105, fig. 25. (西藏亚东)

Dimyra cuprescens: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 142.

Trichoridia cuprescens: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.221.

翅展 33mm。头部与胸部红褐色；前翅褐色微带紫灰色，基线仅在前缘区可见灰色，内线双线黑色，波浪形，线间灰色，自前缘脉外斜至亚中褶折向内斜，环纹小，圆形，灰色褐边，肾纹窄长，有白圈，外线双线黑色，锯齿形，线间灰白色，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜，亚端线不明显，外弯，端区各翅脉布有白色细点；后翅黄白色带褐色，端区色暗，缘毛红褐色，端部褐白色；腹部黄褐色带有红棕色。

分布 西藏。

司冬夜蛾属 *Sydiva* Moore

Sydiva Moore, 1882, Lep. Atk. p. 95.

Type-species: *Sydiva nigrogrisea* Moore.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节向前伸，很长，棒状，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛丛；头部与胸部被粗毛和毛状鳞，头顶有一高丛毛簇；前翅