

线、内线黑色衬红褐色，环纹及肾纹大，褐色，两纹后端接近，外线黑色锯齿形，外侧衬红褐色，亚端线双线黑褐色，在3—5脉处为锯齿形，此段外侧有黑齿纹；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 云南、西藏。

耻冬夜蛾 *Trichoridia herchatra* (Swinhoe) (图版 XXVI-15)

Crymodes herchatra Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. 6 (12): 260. (锡金)

Dimya herchatra: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 142.

Trichoridia herchatra: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 406. —Nye, 1975, Lepid. Cat. Noct. 1—2: 490. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.220.

翅展 32—36mm。头、胸黑色杂白色；前翅黑褐色，翅脉灰色有白点，中区色暗，基线、内线、中线及外线黑色，内线波浪形，内侧灰白色，外线锯齿形，外侧灰白色，剑纹、环纹与肾纹均小，环纹灰色，肾纹黑色，亚端线黄褐色，在3—4脉处呈锯齿形，线内侧一列黑纹，外侧衬黑色；后翅褐黄，翅脉与端区褐色，可见波曲外线；腹部灰色杂褐。

分布 西藏；锡金，印度。

月耻冬夜蛾 *Trichoridia albiluna* Hampson (图版 XXVI-16)

Trichoridia albiluna Hampson, 1906, CatLep. Phal. Br. Mus. 6: 404, pl. 105, fig. 24. (西藏亚东)

Trichoridia albiluna: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.220.

翅展 35mm。头、胸及前翅灰褐色，前翅杂有黑色并布蓝白细点，基线、中线及外线黑色，中线波浪形，外线锯齿形，内线双线黑色，波曲外斜，剑纹、环纹及肾纹均黑边，后者外侧有黄白纹，亚端线灰白色波曲形，两侧衬黑色，内侧多为斑纹状；后翅灰褐色，外线黑色，亚端线褐色；腹部灰色带褐。

分布 西藏。

黑耻冬夜蛾 *Trichoridia leuconephra* Draudt (图版 XXVI-17)

Trichoridia leuconephra Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 78, pl. 5, fig. 17. (云南丽江)

翅展 40mm。头部与胸部黑色有蓝色感，杂有少许灰色；前翅黑色，密布灰色细点，基线灰白色，波浪形，自前缘脉至1脉，内线白色，两侧衬浓黑色，大锯齿形外斜，剑纹黑色，外围微白，环纹灰色，中央微黑，黑边，近圆形，肾纹白色，中有一黑曲纹，中线模糊，浓黑，外斜至中室下角折向内斜，外线白色，两侧衬浓黑色，深锯齿形，外弯，4脉后内斜，亚端线白色，有间断，在7脉前及中褶外内凹，线内侧有一列

新月形黑纹，外侧一列黑纹，翅外缘有一列半圆形黑纹，缘毛端半部微白；后翅褐灰色，端区黑褐色，外线黑色，自中褶至翅后缘，亚端在黑褐端区中现灰白色；腹部灰褐色。

分布 云南。

黄耻冬夜蛾 *Trichoridia flavicans* Draudt (图版 XXVI-18)

Trichoridia flavicans Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 78, pl. 5, fig. 19. (云南丽江)

翅展 30mm。头部与胸部褐色，翅基片浅黄色，中央微白；前翅浅黄色，部分带暗褐色，基线褐色，细弱，波浪形，自前缘脉至 1 脉，内线不显，剑纹仅见外缘褐边线，环纹白色，窄斜，后端尖，与肾纹相连，中央有一棘形褐纹，肾纹白色，窄长方形，中有一褐曲纹，外线不清晰，白色，仅前缘区及 2 脉后明显，亚端线白色，不规则锯齿形，内侧在 5 脉至 1 脉间有几个黑斑，前段向外扩展至顶角成一大斜斑状，端线黑色，波浪形；后翅暗黄褐色，端区带有黑色；腹部黑灰色带褐色，臀毛簇红褐色。

分布 云南。

光耻冬夜蛾 *Trichoridia cuprescens* Hampson (图版 XXVI-19)

Trichoridia cuprescens Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 405, pl. 105, fig. 25. (西藏亚东)

Dimyra cuprescens: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 142.

Trichoridia cuprescens: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.221.

翅展 33mm。头部与胸部红褐色；前翅褐色微带紫灰色，基线仅在前缘区可见灰色，内线双线黑色，波浪形，线间灰色，自前缘脉外斜至亚中褶折向内斜，环纹小，圆形，灰色褐边，肾纹窄长，有白圈，外线双线黑色，锯齿形，线间灰白色，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜，亚端线不明显，外弯，端区各翅脉布有白色细点；后翅黄白色带褐色，端区色暗，缘毛红褐色，端部褐白色；腹部黄褐色带有红棕色。

分布 西藏。

司冬夜蛾属 *Sydiva* Moore

Sydiva Moore, 1882, Lep. Atk. p. 95.

Type-species: *Sydiva nigrogrisea* Moore.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节向前伸，很长，棒状，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角微锯齿形，有纤毛丛；头部与胸部被粗毛和毛状鳞，头顶有一高丛毛簇；前翅