

黄后夜蛾 *Trisuloides subflava* Wileman (图版 I - 9)

Trisuloides subflava Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. Lond. p. 31.

Trisuloides subflava: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 348, pl. 233, fig. 7. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 238, pl. 76, fig. 1729.

翅展 47mm。头部白色，胸背及前翅黑棕杂白色，颈板白色有黑纹，各横线黑色，环纹白色黑边，肾纹前后端为白点，外侧有二长方形白斑；后翅橙黄；腹部暗棕色。

分布 福建、台湾、四川、云南。

内黄后夜蛾 *Trisuloides entoxantha* (Hampson) (图版 I - 10)

Moma entoxantha Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. Moths 2: 435. (锡金)

Trisuloides entoxantha: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 349, pl. 233, fig. 9—Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 238.

翅展 39—48mm。头、胸黄色杂褐黑；前翅褐色带绿，后缘区带黄白，外线褐色，亚端线黑褐色，后端一浅黄斑达臀角，环纹小，肾纹前端黄白色；后翅黑褐，基部及后缘区橙黄；腹部黄色。

分布 福建、四川；锡金。

洁后夜蛾 *Trisuloides bella* Mell (图版 I - 11)

Trisuloides bella Mell, 1935, Mitt. Deut. ent. Ges. 6: 38. (浙江)

Trisuloides chekiana Draudt, 1937, Ent. Rdsch. 54: 400, pl. 4, fig. 2g.

Trisuloides bella: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 11. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p. 948.

翅展 53mm。头、胸黄白杂黑色；前翅浅褐，各横线黑色，基、内线衬白色，外线外侧衬白色，环，肾纹白色黑边，肾纹外有白斑；后翅黄色，有黑褐端带；腹部浅褐黄杂黑色。

分布 浙江、湖南。

污后夜蛾 *Trisuloides contaminata* Draudt (图版 I - 12)

Trisuloides contaminata Draudt, 1937, Ent. Rund. 54: 399, pl. 4, fig. 2f. (云南丽江，浙江天目山)

翅展 45mm。头、胸及前翅褐黑色，各横线黑色，内、外线均双线，环纹大，黑边，肾纹有黄白环，外侧一片灰白区，约似肾形；后翅杏黄色，外缘褐黑；腹部褐黑色。

分布 陕西、山东、浙江、湖南、云南。