



图 22 张后夜蛾 *Trisuloides zhangi* Chen ♂ 外生殖器

#### 黑后夜蛾 *Trisuloides caerulea* Butler (图版 I-4)

*Trisuloides caerulea* Butler, 1889, Ill. H et Colln Br. Mus. 7: 35, pl. 128, fig. 3. (印度)

*Trisuloides coerulea*: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 11: 41, pl. 4e. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 343. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan. p. 947.

翅展 65mm。头、胸黑褐，前翅黑褐有白点，基线与内线褐色，外线与亚端线黑色，环纹褐色，肾纹浅褐白色，有黑褐环，外线外侧至臀角大片白色；后翅黑色；腹部褐黑色。

**分布** 湖南；锡金，印度。

#### 角后夜蛾 *Trisuloides cornelia* (Staudinger) (图版 I-6)

*Acronycta?* *cornelia* Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. 49: 246. (西伯利亚)

*Xanthomantis cornelia*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 18, pl. 4a.

*Trisuloides cornelia*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 345. —Kozhantschikov, 1950, Fn. SSSR, 12: 404, fig. 201. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 237, pl. 76, fig. 1727.

翅展 42mm。头、胸暗褐；前翅黑褐带紫灰，各横线黑色，亚中褶有一白纹，环、肾纹黑色，有白环；后翅杏黄；腹部黑褐色，两侧有黄毛，雄蛾抱钩斜向背，阳茎有短棘形角状器丛 (图 23)。

**分布** 黑龙江、内蒙古；俄罗斯。