

Tyana flatoides Moore, 1888, Lep. Atk. p. 285.

Tyana pustulifera: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 131. ——Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 494. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 422, pl. 40d. ——Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 66. ——Holloway, 1976, Moths Borneo p. 22. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 38—46 mm。头部淡黄色，额有红褐纹，下唇须白色，端部带红色及褐色，触角基节有白斑；胸部背面黄色带绿色，颈板与翅基片白色带有淡褐色，边缘带红色，下胸与足白色，前足胫节红色；前翅绿色，前缘粉红色，基部后方有一褐边的白斑，翅后缘近基部有一褐点，缘毛淡黄色；后翅白色，雄蛾翅反面后缘有褐色毛束；腹部白色。

分布 云南；印度，尼泊尔。

大斑角翅夜蛾 *Tyana maculata* Chen (图版XXXVIII-24)

Tyana maculata Chen, 1993, Ins. Huengduan Mts. p. 1018. (四川卧龙)

翅展 41 mm。头部与胸部赭黄色，触角、颈板外缘及足胫节端部深褐色；前翅绿色，前缘脉白色，但基部及脉后缘深褐色，基线明显黑色外斜，线内方赭黄色，成一三角区，其中杂有少许褐色，内区有一黑褐色圆点，位于前缘脉之后，中区有一黑灰褐色大斑，约呈肾形，位于中室下角至翅后缘间，端区有一黑褐带，其内缘不规则波曲，带的前段最窄，在4—6脉间最宽，在中褶处亦强内突，翅外缘有一列小白斑，形状不一，均围以赭色，外缘毛淡黄色；后翅白色；腹部白色。

分布 四川。

绿角翅夜蛾 *Tyana falcata* (Walker) (图版XXXVIII-25)

Hylophila falcata Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln. Br. Mus. 35: 1772. (印度)

Tyana falcata: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 494. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 422. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 28 mm。头部淡绿色，触角褐色，有粉红色环，基部渐白，额白色，有一粉红色横纹，下唇须白色，端部带粉红色；胸部淡绿色，下胸与足白色，前足胫节与跗节带粉红色，中足腿节端部粉红色；前翅绿色，前缘褐色，中室横脉两端各有一褐点，缘毛白色；后翅白色；腹部白色。

分布 福建、海南、四川、西藏；印度。

一点角翅夜蛾 *Tyana monosticta* Hampson (图版XXXVIII-26)

Tyana monosticta Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 493, pl. 187, fig. 4. (中国西部: Pu-tsu-fong)