



图 241—242 翅脉. 241. 洁尺蛾 *Tyloptera bella bella* (Butler), ♂;
242. 同前, ♀

洁尺蛾 *Tyloptera bella* (Butler, 1878)

Melanippe bella Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 448. (俄罗斯: 符拉迪沃斯托克)

Tyloptera eburneata Christoph, 1881, Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 55 (3): 116.

Microloba bella: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 405.

Tyloptera bella: Inoue, 1982, Moths Japan 1: 469.

寄主植物: 辽东槲木。

分布: 中国, 俄罗斯, 日本, 朝鲜, 缅甸, 锡金。

本种已记述 5 个亚种, 中国分布下述 3 亚种, 另外两个亚种分布日本和锡金。

指名亚种 *subsp. bella* (Butler, 1878) (图版 IV: 26)

前翅长: ♂ 14—17 mm, ♀ 17—19 mm。额上半部及头顶褐色, 额下半部白色。下唇须第一、二节黄褐色, 掺杂白鳞, 第三节白色。胸腹部灰白色。前翅白色。前缘有一列黄褐至褐色斑, 新鲜标本带橄榄绿色, 其中中斑宽大, 下缘邻近黑色圆形中点, 其外侧可见模糊灰黄色影带; 亚缘线白色深波状, 其内侧为一列深灰褐色斑, 由前缘排列至 M_3 , 再由 Cu_2 至后缘近臀角处, 亚缘线外侧至外缘为一条褐带, 带橄榄绿色, 中部色稍浅但通常连续; 缘线深灰褐色, 不连续; 缘毛白色与深灰褐色相间。后翅白色, 具灰