

*Tympanistes pallida*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 421. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 589. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 445, pl. 42g, h. —Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 214.

翅展 49 mm。头部赭黄色带浅灰色；胸部背面赭色，颈板基部赭黄色带灰色，下胸白色，足赭色；前翅白色带赭色，布有赭褐色细点，各横线均不明显，内线浅褐色，波曲，肾纹只现一褐点，外线浅褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，波曲内弯于中褶及 3、4 脉间，亚端线浅褐色，不规则锯齿形，在亚前缘脉及 3—5 脉间外弯，翅外缘有一列褐色点；后翅白色半透明，翅外缘在各翅脉间有一黑褐点；腹部白色，背面带有赭褐色。

分布 西藏；锡金，印度。

### 云膜夜蛾 *Tympanistes yuennana* Draudt (图版 XXXIX-25)

*Tympanistes yuennana* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40:149, pl.9, fig.9. (云南德钦)

*Tympanistes yuennana*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1019.

翅展 37 mm。头部与胸部浅灰褐色；前翅淡灰褐色，布有黑褐细点，内线隐约可见，由一系列黑褐点组成，肾纹只现一黑点，外线由一系列黑褐点组成，微波曲后行，与内线近平行，亚端线隐约可见，由一系列黑点组成，不规则波曲形，翅外缘有一列黑点；后翅锈红色，前缘微黄；腹部暗褐色。

分布 福建、四川、云南。

## 雏夜蛾属 *Churia* Moore

*Churia* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 359.

Type-species: *Churia nigrisigna* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，第三节长，复眼大，额平滑无突起；胸部主要被鳞片；前翅有一长副室；后翅 5 脉发达。

### 圆斑雏夜蛾 *Churia ocellata* (Butler) (图版 XXXIX-26)

*Anomis ocellata* Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 72, pl. 131, fig. 4. (印度)

*Churia ocellata*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 593. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 299, pl. 521. —Gaede, 1938, ibid, 11: 446. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 148. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323.

翅展 28—33 mm。头部灰褐色带红色，下唇须基部灰白色；胸部灰褐色微带红色，下胸与足灰白色，前足腿节上缘黑褐色，前足与中足胫节带褐色，跗节黑色，有白环；前翅灰褐色，布有黑色细点纹，内线由一系列黑点组成，前缘脉的点较粗，列成波浪形，