

Corsa otoensis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 141.

翅展 26 mm 左右。头部与胸部赭黄色杂红褐色及少许黑色，下唇须外侧大部黑色，第二节下缘饰长毛，第三节短小，前足跗节外侧黑色，各节间淡赭黄色；前翅淡赭黄色，部分带褐色，前缘区近基部有一黑褐斑，近中部有一黑纹，两侧各一黑点，外 213 有一较大黑色三角形斑，其后有一小黑斑，端区微带黑色，端线为一列弧形黑点，缘毛赭黄色间黑色；后翅淡赭黄色，有多条不清晰的红褐色横线，均呈微波浪形，中部和外区各有一线带黑色，端线为一列黑点，缘毛似前翅。

分布 江西；日本。

倭夜蛾属 *Tyta* Billberg

Tyta Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Bllbg. p. 88.

Type-species: *Noctua italicica* Fabricius.

Dysthymia Newman, 1868, Entomologist 4: 174.

喙发达，下唇须向前平伸，第二节下缘饰鳞片，第三节短，触角线形，胸部主要被鳞片，后胸有毛簇，前翅宽，外缘平稳弧曲，后翅宽。雄蛾腹部较短。

倭夜蛾 *Tyta luctuosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 LIX - 37)

Noctua luctuosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 90. (奥地利)

Noctua italicica Freyer, 1781, Spec. Ins. 2: 218.

Tarache luctuosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 286, pl. 52k.

Acontia luctuosa: Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 257. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 334.

Tyta luctuosa: Bretherton et al., 1983, Br. Moths & Butterflies 10: 368.

翅展 22—25 mm。头部与胸部黑褐色杂灰白色及浅褐色，下唇须大部黄白色，足跗节外侧黑褐色，各节间有黄白斑；前翅黑褐色杂紫灰色及浅褐色，基线粗，黑色，自前缘脉细锯齿形外弯至亚中褶，内线粗，黑色，在前缘区细锯齿形，其后波浪形外斜，环纹扁圆形，暗褐灰色，黑边，中线不明显，黑色，在前缘区为模糊黑斑，外斜至中室后折向内斜并呈波浪形，中室端部外有一白色盾形大斑，前端达前缘脉，后端至 3 脉，外线黑色，微波浪形，自前缘脉外弯，4 脉后内斜，在亚中褶成一内突齿，外区前缘脉有一列白点，亚端线黑色锯齿形，后段不显，线内侧有黑纹，外侧杂白色，7 脉前一白纹，臀角一白斑，端线棕褐色，内侧一列黑纹；后翅黄白，基部带黑色，横脉纹大，黑色，端区一黑宽带，亚中褶端部一小白斑；腹部黄白，有黑横条。

寄主 甘薯、田旋花。

分布 新疆；欧洲，非洲北部。