

Type-species: *Ulotrichopus tortuosus* Wallengren.

Ulotrichopus Wallengren, 1865, K. Svensk. Vetensk Akad. Handl. 5 (4): 76.

Alura Moschler, 1883, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 33: 303.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，前缘有较长的鳞片，额光滑无突起，有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，有纤毛丛，前胸有毛簇，雄蛾腿节饰长毛，中足腿节基部有长毛簇，前足胫节饰长毛，后足胫节具刺；前翅稍长窄，有一副室，后翅宽，中室长约为后翅之半，5脉发达，自中室下角稍前发出，腹部第一、二节背面有毛簇。

斑蜗夜蛾 *Ulotrichopus macula* (Hampson) (图版 XLIX-1)

Audea macula Hampson, 1891, Ill. Het. Br. Mus. 8: 18, 84, pl. 146, fig. 21. (印度)

Ulotrichopus macula: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 456. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 349.

翅展 67mm。头与颈板深棕色，胸背灰色，翅基片内缘有黑棕线；前翅灰色带褐色并密布黑棕细点，基线仅前端现二黑纹，内线双线黑色波浪形，外一线前端为黑斑，肾纹白色，中有黑棕环，外缘锯齿形，外线黑色锯齿形，前段内侧有灰白斜影，亚端线隐约可见灰白色，翅脉微黑；后翅黄色，横脉纹微黑，其最后一黑圆斑，端带黑色，腹部黄色，后半带灰褐色。

分布 台湾、海南、四川；印度，斯里兰卡。

封夜蛾属 *Arcte* Kollar

Arcte Kollar, 1844, in Hugel, Kaschmir und des Reich der Siek 4: 477.

Type-species: *Arcte polygrapha* Kollar.

Cocytodes Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 41.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额中部，第三节短，额平滑，复眼圆大；胸部仅被毛，无毛簇，胫节饰长毛，均具刺；腹背扁平，有细长毛；前翅狭长，有副室，顶角较钝，外缘曲度平稳，成锯齿形；后翅中室约为翅长的 1/3。

苕麻夜蛾 *Arcte coerulea* (Guenée) (图版 XLIX-2)

Cocytodes coerulea Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 41. (Indes Orientales)

Cocytodes coerulea: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 457.

Cocytodes caerulea: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 259. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 349.