

分布 湖北、广东。

刚鹰冬夜蛾 *Valeria muscosula* Draudt (图版 XXV-22)

*Valeria muscosula* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 69, pl. 5, fig. 5. (云南德钦、丽江)

翅展 36mm。头部与胸部霉绿色杂黑褐色及少许白色，颈板端部大部黑褐色，足外侧黑褐色，胫节及距有白斑，跗节各节间有白斑；前翅暗绿色，部分带黑褐色，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，线间黄绿色，内线双线黑色，波浪形，前端粗，自前缘脉外斜至中室后内斜，线间在中室前及 1 脉后黄绿色，其余暗绿色杂白色，剑纹黑边，半圆形，环纹大，有不完整的黑边，边线内缘有少许白色，肾纹大，钟形，色似环纹，中线黑色，在前缘脉上为三角形黑纹，外斜至中室下角，折角内斜并呈锯齿形，外线双线黑色，锯齿形外弯，4 脉后内斜，线间杂有白色，亚端线黑色，锯齿形，外侧杂有白色，前缘脉有一列白点，间以黑色，近翅外缘有一列新月形黑纹，缘毛中有一波浪形模糊黑线；后翅暗褐灰色；腹部暗褐色。

分布 云南。

碧鹰冬夜蛾 *Valeria tricristata* Draudt (图版 XXV-23)

*Valeria tricristata* Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 141, pl. 171. (南京)

*Valeriu tricristata*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 68. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 316. ——Chen, 1985, Econ. Ins.

翅展 46mm。头与颈板黑褐色；胸部褐色；前翅褐色带灰色，外线以内略带紫色，前缘区、中室前后缘、1 脉及端区有亮绿色，基线、内线均双线黑色，剑纹仅端部现一白纹、环纹及肾纹内、外缘白色，后者中凹，外线黑色锯齿形，亚端线白色锯齿形，线内侧衬黑色；后翅浅黄色，外半渐带褐色，外线褐色，亚端线白色；腹部灰色。

分布 江苏、湖南、江西。

绵鹰冬夜蛾 *Valeria mienshani* Draudt (图版 XXV-24)

*Valeria mienshani* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 70, pl. 5, figs. 7, 8. (山西绵山)

*Valeria mienshani*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 316.

翅展 40mm。头部与胸部灰褐色杂有少许黑色，头顶及颈板上缘灰色；前翅灰褐色杂少许黑色，基线双线黑色，自前缘脉至 1 脉，内线双线黑色，波浪形，稍外斜，环纹暗褐色，有灰色及黑色外缘，但前端开放，肾纹灰色，黑边，中线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至肾纹内后端，折向内斜，外线黑色，锯齿形，外侧衬灰白色，自前缘脉外