

它兽洞。

性机警,凶猛,嗅觉灵敏,视觉较差,能攀树。春夏季节,喜晨昏和夜间活动。阴雨和下雪天较少出洞。平时单独活动,即使成对外出,也多见分散在附近活动。能两只后脚直立坐地吃食。夏季结群活动,行走时,由于在沙垅上前后紧密相跟,结成一字队,弓腰弯背迅速前进,显目花斑的虎鼬队列,使人骤然联想到“龙”的形象,故当地牧民又称为“花地龙”。

食物比较简纯,主要捕食荒漠中各种鼠类以及荒漠上的蜥蜴和小鸟。尤喜夜间捕食跳鼠和黄鼠,捕食中,采用掘洞捕食的方法,能在一夜间,掘洞达数十个之多,新掘的洞深多见 30—40 厘米左右。栖居在居民点附近的虎鼬,偶而潜入室内或仓库里盗食肉食,或捕食户内家鼠。乌审旗的牧民有时特意将捕回的虎鼬关在室内,让它专门捕食害鼠。入冬前,虎鼬在夜间频繁地捕跳鼠和黄鼠,将其库存在洞内以备过冬。

遇到追捕和威胁,能够迅速地钻进附近鼠洞或隐蔽处,不及躲避时,即刻掉转身体方向,脊背高高隆起,尾巴向前立,周身的毛峰竖立,使整个体躯轮廓骤然变大,加之该兽咆哮声短而急,显出一副十分凶残的样子,此时,它常主动向人袭击或寻机逃走。

臭腺能散发奇特的骚臭味。

虎鼬栖居的地方,一般避开辽阔的草原和纯沙漠区,在石砾坚硬的荒原或潮湿的水地附近,也很难找到它的足迹。然而虎鼬特定的生境内却很难遇见黄鼬栖居,形成所谓生态学上的“替代现象”。

开春前后发情,孕期两月左右,一般 4 月下旬产仔,每胎 4—8 个,新生幼仔的斑纹显著,体长约 12 厘米左右,哺乳期一月左右,幼兽跟随母兽外出捕食。

幼兽便于人工饲养和驯化。但在人户内放养的虎鼬,在食物断缺时,有可能咬伤睡觉人的鼻耳。

分类 该种最早由 Sowerby (1914) 将采自与陕西榆林县临界的乌审旗皮张定名为 *Vormela peregusna negans* 以后, Allen (1938)、Pocock (1936)、Miller-Edward (1934)、Ellerman. & Morrison-Socott (1951) 均无异议。查看我国新疆、内蒙古、陕西、青海等省区的标本,并无明显地理性差异,同属 *V. peregusna negans*。

经济意义 虎鼬在改造荒漠、半荒漠地带具有灭鼠除害及保护沙漠植被的积极作用。但数量稀少,我国当前应积极保护和严禁捕猎。

亚种

(1) 蒙新亚种 *Vormela peregusna negans* Miller

分布见种的记述。

1910. *Vormela negans* Miller, Proc. U. S. Nat. Mus. 38:385. pl. 17 (模式产地: 鄂尔多斯荒漠(即内蒙古的乌审旗))。