

1 ♂, 山东泰山, 1981. VI. 17; 1 ♀, 山西交口, 1991. VIII. 8; 1 ♀, 青海互助北山, 2 300 m, 1991. VII. 30。




图 321—323 雄性外生殖器. 321. 暗褐潢尺蛾 *Xanthorhoe quadrifasciata quadrifasciata* (Clerck); 322. 淡愚潢尺蛾 *X. stupida aridela* (Prout); 323. 汉潢尺蛾 *X. hampsoni* Prout (J. 阳端基环腹突)

分布：黑龙江、吉林、内蒙古、北京、山东、山西、甘肃、青海；日本，俄罗斯，欧洲。

愚潢尺蛾 *Xanthorhoe stupida* (Alphéraky, 1897)

Cidaria stupida Alphéraky, 1897, Rom. Mem. Lepid. 9: 73. (俄罗斯)

Larentia unidentaria var. *stupida*: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb. 1: 298.

Cidaria (*Xanthorhoe*) *ferrugata stupida*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 227.

Cidaria (*Xanthorhoe*) *stupida*: Prout, 1937, ibidem 4 (Suppl.): 127, pl. 12: c.

Xanthorhoe stupida: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 567.

分布：中国，俄罗斯，朝鲜。

指名亚种分布俄罗斯，中国广泛分布下述亚种。

淡色亚种 subsp. *aridela* (Prout, 1937) (图版 VI: 7)

Cidaria (*Xanthorhoe*) *stupida aridela* Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 127, pl. 12: c. (俄罗斯：哈巴罗夫斯克)