

检视标本: 1 ♂ 1 ♀, 云南丽江玉龙山, 1962. VII. 21; 2 ♂, 同前, 2 800 m, 1984. VII. 15、17; 1 ♀, 云南云龙志奔山, 2 430 m, 1981. VI. 25; 2 ♀, 云南大理中和峰, 2 600—3 000 m, 1980. IX. 2、7; 1 ♀, 云南宾川鸡足山, 2 200 m, 1982. VI. 10。

分布: 湖南、四川、云南。

迷黑点尺蛾 *Xenortholitha ignotata* (Staudinger, 1896) comb. nov.

Cidaria ignotata Staudinger, 1896, Dt. ent. Z. Iris 9: 400. (青海: 库库诺尔)

Cidaria ignorata Staudinger, 1895, ibidem 8: 336. (nec Staudinger, 1892)

Larentia ignotata: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb. 1: 292.

Ortholitha nipponica ignotata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 165, pl. 8: i.

Ortholitha ignotata: Prout, 1937, ibidem 4 (Suppl.): 79.

分布: 甘肃、青海、四川、云南、西藏。

指名亚种 subsp. *ignotata* (Staudinger, 1896) (图版 XVIII: 32)

前翅长: ♂ 14—16 mm。十分近似凸黑点尺蛾。色较灰, 缺少黄褐色调。前翅基部至外线深灰褐色至黑灰色, 灰白色亚基线和中线弯曲较该种深; 黑色中点微小; 外线中部凸齿稍尖, 较该种略长; 外线外侧灰白色, 略带灰紫色调, 亚缘线极弱或消失, 顶角下方的两个黑斑存在。后翅几乎与凸黑点尺蛾相同, 但外线以内颜色较浅。翅反面基半部深灰色, 外线以外灰白色, 略带黄褐色调, 可见亚缘线的白点列。后翅中室端脉双折角。

雄性外生殖器 (图 829): 钩形突细长。阳茎基环侧突棒槌状, 端部毛束细弱。抱器瓣短宽, 抱器背端部 (抱器瓣顶角) 略凸, 呈一尖角。阳茎细长, 角状器为三支短粗刺和数支微刺。

检视标本: 1 ♂, 甘肃迭部腊子口, 2 000 m, 1990. IX. 9; 1 ♂, 青海湟中, 1977. VIII. 6。

分布: 甘肃、青海。

贡嘎亚种 subsp. *indecisa* (Prout, 1937) comb. nov.

Ortholitha latifusata indecisa Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 79, pl. 8: b.

(四川: 贡嘎山)

前翅长: ♂ 16 mm, ♀ 15—18 mm。体型较大, 颜色平均较深。前翅顶角较指名亚种凸出明显; ♂ 前翅基部至外线近于黑褐色, 外线以外颜色仅略浅; ♀ 外线外侧灰白色