

5. 棕眉山岩鹀 *Prunella montanella* (Pallas) (图版 N 图 2)

英文名: Mountain Accentor.

Motacilla montanella Pallas, 1776, Reise versb. Prov. Russ. Reichs, 3. p. 695 (模式产地: 达乌尔).

Prunella montanella badia Portenko, 1929, Compt. Rend. Acad. Sci. Leningrad leningrad, ser. A: 220 (模式产地: 西伯利亚北部 Chukchi).




图 138 棕眉山岩鹀 *Prunella montanella* 的分布图

鉴别特征 很似黑喉岩鹀 *P. atrogularis* 但喉部牛皮黄色, 胸部黑色斑点, 背浓栗褐色。

形态 (据采自陕西标本)

成鸟: 额、头顶、枕黑色; 颈、肩、背栗褐, 具灰白色羽缘和不很明显的中央羽轴纹; 腰和尾上覆羽橄榄褐色, 但腰羽色泽较淡; 飞羽和尾羽褐色; 中覆羽、大覆羽具白色羽端斑 (有的个体为棕白), 因而在翅上形成两道明显的翅斑。眼先、颊、耳羽黑色, 眉纹棕色; 下体颏、喉、胸一直到上腹棕色; 下腹和尾下覆羽棕黄色。雌雄形态相似。

嘴尖端黑色, 嘴基黄褐色; 跗蹠肉色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	18. —	160, 157,	10.4	71.5	68.8	19.6
		158, 151	(10—11.4)	(65—76)	(66—74)	(19—20)
♀♀ (6)	17.5. —	155, 155	10.2	71.5	68.7	20.2
			(9.5—11)	(66—74)	(64—72)	(19—22)

地理分布 国内分布于东北西北部呼伦贝尔盟满洲里、中部哈尔滨 (旅鸟); 东北南部和西南部赤峰, 河北, 山东, 陕西, 宁夏贺兰山, 青海西宁, 甘肃西北部武威 (冬候鸟); 上海 (迷鸟)。国外分布于西伯利亚, 蒙古, 朝鲜。